

DISSERTATIO PATHOLOGICO-PRACTICA
SISTENS
NOVAS OBSERVATIONES
DE
INFARCTIBVS VENARVM
ABDOMINALIVM INTERNARVM,
EORVMQVE RESOLVTIONE
PER ENEMATA POTISSIMVM
INSTITVENDA.

QVAM
CONSENTIENTE GRATIOSA FACVLTATE MEDICA
PRAESIDE
VIRO EXCELLENTISSIMO ATQVE EXPERIENTISSIMO
GEORGIO FRIDERICO SIGWART

PHILOS. ET MEDIC. DOCT.

MEDICIN. CHIRVRG. ET ANATOM. PROF. PVBL. ORD.

MEDICO AVLICO WIRTEMB.

PRO LICENTIA

SVMMOS IN MEDICINA HONORES ET PRIVILEGIA
DOCTORALIA RITE CAPESSENDI

PVBlice VENTILABIT

AVCTOR

IOH. FRID. ELVERT, Vayhingenſis.

D. MAII MDCCLIV.

TVBINGAE, LITTERIS ERHARDIANIS.

THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF
ART AND
ARCHAEOLOGY
OF THE
UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE
100 Brook Hill Drive
Cambridge, Mass. 02139
U.S.A.
Telephone (617) 495-2200
Telex 281141
Cable 281141
Fax (617) 495-2200
Internet: <http://www.museum.cam.ac.uk>



PRAEFATIO.

Praesens, quod offero, thema ita comparatum est, ut neque penitus novum, neque tamen satis pro dignitate excussum videatur.

Morbi, quos antiquissimi auctores medici sub atrae bilis nomine descripserunt, ut plurimum infarctuum in his illisve venæ portarum ramis nidulantium effectus erant; neque humor atrabilarius aut melancholicus, juxta antiquam hypothesein in liene genitus, aliud quid fuit, quam sanguis plus minusve corruptus, stagnans atque incarcerationis. HIPPOCRATEM ipsum sub bilis atrae nomine saepius nil nisi sanguinem corruptum, piceum, putrefactum intellexisse, ex variis locis divinare licet.

Recentiores pariter, BALLONIVS, FERNELIVS, MARTINI, SPIGELIVS, & qui non alii? de atra bile, mesenterio ejusque vasis, ut causa & sede plurimorum morborum, commentati sunt, licet non abs hypotheseum fuco liberam proposuerint veritatem.

Rectius illam perspexerunt Viri in maxima medicinae commoda nati, FRID. HOFFMANN, STAHL atque BOERHAAVE, suamque theoriam anatomico-physiologicis inventis auctiorem perfectioremque, ac pathologico-therapeuticis meditationibus utiliorem proposuerunt.

Horum vero inventis novam lucem attulit recentissime nostri aevi Medicus, & ingenii acumine & felicissima praxi perclarus, dum viveret, Archiater KAEMPFF: Is



non tantum infarctuum indolem sedemque accuratius defini-
nivit, sed & novam eandemque perfectiorem medendi
methodum candide exposuit.

Hujus igitur Viri vestigiis insistens & ego, in prae-
senti specimine academico potiora momenta de infarctibus
venarum abdominalium, quae vel ex auctorum monu-
mentis vel propria observatione hausi, breviter propo-
nere, methodum eos resolvendi enarrare, & inprimis
Clysmatum (in quorum usu primarius Curationis cardo
vertitur) actionem usumque explanare, eorumque neces-
sitatem demonstrare tentavi.

Temerarii & irriti conaminis me arguent forte plu-
rimi, quod adeo frequentem & diuturnum clysmatum
usum commendare audeam civibus nostris, qui, si ullum
unquam, certe hoc remedii genus abhorrent & contem-
tui habent. Et omnino difficultatis plenus labor est,
veteres avias, ut cum PERSIO loquar, hominibus *de*
pulmone repellere. Interim tamen, cum remedia non ex
praeconceptis opinionibus aut fama, quam in plebe tuen-
tur, sed ex ipso, quem edunt, effectu aestimanda sint:
multa excusatione forsitan non indigebo, si methodum
medendi propono & commendo, non admodum cogni-
tam, utilem tamen, cujus felices successus coram intui-
tus sum, & quae unica forte superest in nonnullis casu-
bus. Ceterum ea, qua decet, modestia hos qualescun-
que conatus meos aequo lectoris judicio trado, pro-
positasque meditationes emendandas, augendas, perfici-
endas ipsi relinquo atque commendo.





I.

Per *Infarctus Venarum abdominalium* intelligo illarum prae-
 ternaturalem repletionem atque distensionem, ortam
 a materia varia hinc inde in earum cavis collecta. Infarctuum definitio.

II. Materiam infarctuum constituit sanguis, qui pro varia, Materia.
 quam acquisivit, indole, magnam infarctuum differentiam
 facit; Observationes enim, postea recensendæ, docuerunt:
 non modo lentum spissumque sanguinem, sed & polypos, mas-
 sas carni similes, quin concrementa tartarea, sabulosa, calcu-
 losque in his vasis reperiri.

Generatim vero qualitate & consistentia materiae differen- Species.
 tes infarctus revocari possunt ad *duas species*, quarum priorem
 constituit nimia sanguinis in vasis accumulatio, nondum peni-
 tus destructo fibrarum canalis tono, & subsistente aliquantulum
 illius motu progressivo; alteram vero sistit Oppilatio vasorum,
 facta a materia in massam solidam concreta, cum toni abolitio-
 ne, & sublato humoris motu progressivo. Prioris Speciei in-
 farctus *incompletos*, posterioris vero *completos* appellabimus.
 Hi præcipue hujus Dissertationis thema constituunt, cum vero
 priores semper habeant comites, & illorum simul ratio erit
 habenda.

Sanguinis
dispositio ad
infarctus in
venis in ge-
nere.

III. Sanguinem constituunt particulae heterogeneae, quae jugi motu agitatae in debita mixtione & fluiditate conservantur, massamque constituunt adparenter homogeneam; quam primum vero moveri desinunt, haec mixtio perit, &, dum fluidiores moleculae a crassioribus secedunt, hae posteriores coeunt, arctius adunantur, atque sic abeunt in coagulum solidum, quod continuata quiete sensim in solidius & peregrinae indolis corpus evadet.

Prior sanguinis status in arteriis obtinet, in iis enim vegeto motu, & intestino & progressivo, jugiter agitatus sanguis in perfecta particularum mixtione constitutus est; In venis vero lentiori motu propellitur, inaequaliter etiam mixtus & magis resolutus, & ipsa venarum fabrica laxior est; Venae ergo molecularum separationi magis favent quam arteriae, unde etiam, accedente quadam causa occasionali, particulae crassiores sanguinis, terrestres, gelatinosae, viscidae, facile in his venarum viis haerent, atque fluxiliorum in circulum abeuntium connubio orbatae, stagnant, coeunt & solida coagula gignunt; hinc polypi veri & sic dicti pseudo-polypi frequentius in venoso quam arterioso systemate reperiuntur.

In Vena
Portae, re-
liquisque ab
dominali-
bus venis.

IV. Ex his ergo patet, venas in genere magis favere infarctuum generationi, quam arterias; peculiare vero & domesticae in vena portarum (quae maxima parte venas abdominales constituit) adsunt rationes, quae non tantum sanguinis stagnationibus sed & infarctibus amplissimam suppeditant occasionem. α) Sanguis iste magnam fluxiliorum particularum fecit jacturam, venularum resorptionibus non satis refarcitam, & oleosis, viscidis particulis prae alio sanguine abundat, hinc ex hac sua natura majorem ad stagnandum habet dispositionem; β) vehitur in vena portae ventrali motu ascensorio, via sane liquidorum gravium progressui non favente; γ) Tota vena portae ventralis nullis in sua via fulcitur partibus solidis, uti aliae venae, sed inter molles partes, facile cedentes membranas, decurrit; δ) Valvulis prorsus destituitur; magno itaque, quo aliae gaudent venae, motus sanguinis progressivi ad-

adjumento caret; e) Dum hepar ingreditur, hepatica tunc salutata, deposito venae officio, arteriae munere fungitur, primariis arteriarum praerogativis, tunicarum robore scilicet & pulsu destituta, sanguinem tunc per majores primo ramos, paulo post minores & minimos denique angustissimosque ramulos distribuit, frictionem ergo ad latera, motusque progressivi retardationem, uti arteriae, superare debet a); in tanta vero a corde distantia, praeter diaphragmatis motum ac remotiorem musculorum abdominalium actionem, forsan & arteriae hepaticae pulsationes, nulla ipsi ab extus accedant subsidia, quae sanguinis progressum adjuvarent; capsula enim, quam vocant, GLISSONII, cui multum tribuebunt plurimi auctores, nil est, nisi tela cellulosa, vasculis nervulisque picta, quae quidem venarum ramis vaginam dat, eosque, ut luminis rotunditas conservetur, jecoris substantiae affigit, nullas vero intertextas habet fibras musculosas b).

Quae de venae portae ventralis dispositione ad infarctus suscipiendos diximus, maxima parte etiam de reliquis venis abdominalibus asseri posse, quivis facile intelliget, qui harum structuram, situm reliquasque novit conditiones.

V. Ergo totum venae portarum systema reliquaeque abdominales venae infarctuum sedes fieri possunt; si tamen omnium harum venarum decursum, vicinitatem atque connexionem cum adjacentibus partibus specialiter consideramus, atque infarctuum causas occasionales simul respicimus; tunc intelligemus, Ventriculi, intestinorum, Coli inprimis & Recti atque Uteri Venas illis potissimum & prae reliquis subesse. Speciatim vero in venis ventriculi, intestinorum, uteri.

Ventriculi quidem & intestinorum venae facilius eos suscipiunt, quoniam ille horumque totum volumen variis irregularibus motibus adversisque vicissitudinibus subsunt, tum ob ingesta

a) V. HALLEI primae Lineae physiologiae. Gœtt. 1751. §. 675. p. 438. collat. cum §. 58. 133. 148.

b) L. FANTONI Anatomia Corporis

humani ad usum theatri accommodata. Aug. Taur. 1711. Part. I. p. 109. A. F. WALTHERI Progr. I. de Vena Portae Lips. 4. 1739. p. 7. & seq.

ingesta vitiosa, tum etiam ob singularem, quem ventriculus & intestina alunt, consensum cum transpirationis viis aliisque corporis partibus c). Coli & Recti vasa id prae reliquis singulare habent, quod longo & fere perpendiculari itinere suum sursum ducant sanguinem. Flexuosus vero & implicatus decursus in spongiosa parte ad infarctus suscipiendos peculiariter disponit vasa uterina, quae praeterea multis exposita sunt injuriis, tam internis, quam externis, ob mensium negotium, graviditatis, partus atque puerperii conditiones.

Afferimus itaque cum *Cl. KAEMPFFIO* d) primariam infarctuum, completorum inprimis, sedem omnino esse in modo memoratis ventriculi, intestinorum & uteri venis; ita tamen, ut reliquas non excludamus, easque, in mali diuturnitate, incompletorum praecipue sedem fieri statuamus. Cum enim completi infarctus vasis cavitatem perfecte obstruant, omnique liquido obicem ponant insuperabilem: necessario sanguis ad alios ramos regurgitat atque in illis accumulatur.

Sectiones
practicae
propositam
sententiam
confirmantes.

VI. Hanc sententiam sectiones practicae atque cadaverum inspectiones confirmant. Sic venas in abdomine varicosas maximae molis vidit *R. COLVMBVS* e); mesaraica vasa intestinorum tenuium, ilei praesertim, nigro sanguine valde distenta, simulque totum ventriculum cruenta ejusmodi materia repletum *FR. HOFFMANNVS* deprehendit f). *GVARINONIUS* in hypochondriaco venas mesentericas obstructas & adeo dilatatas invenit, ut speciem intestinorum prae se tulerint g). Ingentem sanguinis visceri saburram in venis mesaraicis sibi visam refert *BRUNNERVS* h). Ictero nigro mortuum secuit *VESALIUS*, atque venae portae ramum sub coli intestini fine,

c) *F. HOFFMANNI* Opera omnia, in fol. Genev. 1748. T. I. p. 312. §. 15. *BAGLIVVS* de fibra motrice, cap. 9. 10. in Oper. omn. Lugd. 4. 1710. p. 334.

d) de Infarctu Vasorum Ventriculi, Basil. 4. 1751. §. 6. p. 9. in hac dis-

sertatione filius parentis & proprias observationes descripsit.

e) De Re anatomica, Lib. XV. in fol. Venet. 1559. p. 264. 265.

f) L. c. T. II. p. 214. §. 17.

g) Consil. medicin. Cons. 484.

h) Consil. med. C. 7.



& tota recti longitudine in mesenterio ductum, pollicis fere crassitiem aequare & sanguine turgere animadvertit i). In Principe melancholico, sedentariae, dum viveret, vitae dedito mesenterium nigris varicibus undique circumseptum visum describit BONETVS k). Illustrissimi cujusdam morbum describit KAEMPFF, qui ab infantia atrophicus, vicesimo aetatis anno haemorrhoidibus aliisque hypochondriacis pathematibus correptus, sexagenarius imminentem mortem feliciter evasit, postea vero ex incongrua medicatione obiit; hujus cadaver copiosos vasorum abdominalium infarctus a sanguine corrupto, spisso, natos exhibuit, ut perpauca vasa, sanguinem adhuc fluxilem vehementia, reperirentur. l).

Calculos vero in jecore, vena portae, & speciatim in venis haemorrhoidalibus viderunt R. COLVMBVS m) & TH BARTHOLINVS n). Mulieris per plures annos variis chronicis pathematibus subjectae & sexagesimo circiter aetatis anno apoplexia mortuae cadaver in abdominis & praesertim uteri vasis, hujusque cavitate multa concrementa, intestinum rectum petrefactum, & uteri collum solito longius ac sesqui pollicis longitudine osseum conspicienda praebuit Cl. KAEMPFFIO o). Idem auctor in femina crebriori vomitu, reliquisque (XVIII) descriptis pathematibus laborante & mortua invenit ventriculi vasa nigro atque sphaceloso sanguine incredibilem in modum distenta, ovarium vero & uteri vasa cum rene sinistro petrefacta p). In alia simili morbo defuncta omnia ventriculi & oesophagi vasa sanguine distenta & disrupta vidit, liene incolumi q). In nobili alia femina, quae ob abdominis tumorem se gravidam putabat, uterum plura concrementa, quorum ali-

i) de Corporis humani fabrica, in m) l. c. p. 266.

fol. Basil. 1542. Lib. V. C. 15. p. 663.

k) Medicina Septentrionalis, fol. Genev. 1684. p. 692. C. 13.

l) De infarctibus vasorum in infimo ventre. 4. Argent. 1752. Cas. 2.

Hanc dissertationem defendit D. KOCH, sed auctor est Cel. KAEMPFF.

n) BOERHAAVE Praelectiones de Calculo p. 140. quae extant in Consultationibus medicis Goettingae 1752. 8. editis.

o) de infarctu vasorum Ventriculi. Cas. 2. p. 32.

p) l. c. Cas. 5. p. 34.

q) l. c. Cas. 6.



qua scirrhosam prae se ferebant indolem, fovisse deprehendit modo laudatus KAEMPFFER). Calculosa etiam concrementa in utero reperiri observationes docent; HIPPOCRATES describit calculum fusi verticillum propemodum aequantem, ex ore uteri manu extractum s). Calculum ad duas uncias in cavo uterino repertum memorat BOERHAAVE t).

Hisce observationibus & illae de rejectionibus massarum carnosarum, polyposarum, &c. a molis veris admodum diversarum, ex utero, historiae addi merentur; de quibus, praeter Kaempffiana observata u), frequentem mentionem faciunt auctores plurimi, e quibus STAHLIVM w) atque HOFFMANNVM x) nominasse sufficiat.

Infarctuum
quantitas.

VII. Quantitatem sive molem infarctuum plerique recensitarum observationum auctores non designarunt; magnam vero illam subinde esse, ex observata vasorum dilatatione conjicere licet; maximae molis varices fuisse dicit COLVMBVS, & intestinorum speciem vasa prae se tulisse GVARINONIVS testatur. Sane, cum infarctuum ea sit indoles, ut perpetuo crescant, venae vero, uti omnes corporis partes membranaceo-vasculosae y), in prodigiosam molem, absque ruptura, extendi possint; facile intelligitur, in mali diuturnitate magnam materiae infarciensis vim collectam praesto esse in corpore, id quod subsequente illius evacuatione copiosa satis confirmatur.

r) De Concrementis Uteri, Bas. 1753. Cas. 4. p. 29. Haec Disputatio, quae Respondente D. SCHMID prodiit, si non ab ipso D. KAEMPFFIO scripta est, certissime tamen observationes ex ejus Praxi desumptas proponit.

s) Epidemic. Lib. V. p. 1149. Ed. Foës.

t) Praelect. de Calculo, p. 137.

u) Disp. cit. Cas. 1. 2. 3. s. 6.

w) in Collegio casuali magno, p. 795.

x) Oper. om. T. III. 186. 187. & passim alibi.

y) Exempli loco sint tumores varii, oedematosi, steatomatosi, &c. Aliquot horarum spatio omnia fere intestina in scrotum delapsa, hoc eum in modum extenderunt, ut ad genua propenderet, non ruptum, sed crassius factum. *Acta Nat. Cur. Vol. IV. Obs. XXV.*

Transactiones anglicanae, ni fallor, feminae historiam recensent, cui mammae una nocte ita tumefactae & adauctae sunt, ut pedes attingerent, aegramque evigilatam pondere suo detinerent immobilem.

tur. Una nocte tres quatuorve sanguinis nigri & foetidissimi mensurae excretæ fuerunt absque notabili molestia, & tamen sequentibus diebus tum per alvum, tum vomitu, sanguis niger rejiciebatur z). Praeter polyposa concrementa ex utero eliminata, incredibilem calculorum copiam per alvum ejecit mulier, quorum partem aliquam collegit medicus celeberrimus, qui, fraudem suspicatus primo, per plures horas, & sub ipsa alvi exoneratione, aegrotæ adstitit a). Alia intra quinque dies eam concrementorum copiam ex utero rejecit, quæ duorum foetuum molem longe superabat b). Sarcoma, uteri fundo accretum, pondere centum libras excedens describit TREYLING c). Tanta polyporum excretio per alvum aliquot dierum spatio procedebat in hypochondriaco, ut, nisi plures homines fide dignissimi id testarentur, incredibile videretur d). Et omnino harum excretionum ea est conditio, ut, nisi quis testis fuerit avtopta, facile, licet immerito, hisce narrationibus deneget fidem.

Similes, quas ego ipse vidi, evacuationes adeo copiosæ non erant, sed eo diuturniores; quovis die rejiciebatur materia ea circiter quantitate, quæ fecum alvinarum molem interdum æquabat, sæpius vero duplo, quin triplo eam superabat, sed continuabatur per plures menses, quin per integrum annum, ut id, quod evacuatum est successive, in suo aggregato omnino immensam constitueret copiam. e).

Hæc vero allegatae observationes intelligendæ sunt de malo inveterato, quod, si recentius sit, diffusam adeo sedem omnino non habet.

VIII. Causæ hujus mali prædisponentes sunt venarum abdominalium debilitas & laxitas: Sanguinis spissitudo, viscositas nentes.

Causæ prædisponentes.

z) KAEMPFER de Infarct. Vas. Ventr. Cas. 3. p. 33.

d) KAEMPFER de infarctibus vasorum in inf. ventre, Cas. 2. p. 34.

a) ibid. Cas. 4.

e) Cui hæc incredibilia videntur, illegat ea, quæ de stupenda excretionem per alvum in hypochondriaco Anonymus quidam commentatus est in den gesellschaftlichen Erzählungen. III. Th. p. 294. 295.

b) Disput. de Concrementis Uteri, Cas. 1. p. 26.

c) In Actis Nat. Cur. Vol. IX.



tas aut alia, ut loquuntur, intemperies. Debiles enim & laxae venae debita in sanguinem reactione fungi haud valent, ipsi cedunt nimis, nimiam dum patiuntur dilatationem, sanguinis congestionibus, stagnationibus, quae infarctuum principia sunt, ansam suppeditant. Idem fit, si ex memoratis temperiei vitiis sanguis ipse immeabilior atque ad circulationem ineptior sit.

Adeo arctum vero solida inter & fluida commercium sanctum est per leges corporis mechanicas, ut neque solidi vitium diu perstet sine fluidi labe, neque fluidum diu peccet sine solidi morbo; Si vero & fluidi & solidi vitium adsit simul, eo promptiores erunt infarctuum natales.

Occasiona-
les.

IX. Causae occasionales, quae magis minusve remote infarctus producant, variae sunt & fere innumerabiles; potiores tantum recensebimus: Ciborum copia excedens, nimis diversorum ingluvies, diaeta etiam nimis anxiosa & scrupulosa, quae non nisi teneros, nullius fere consistentiae, cibos praecipit, potus calidarum abundans, spirituosorum abusus, digestionis officinas vario modo laedunt, atque ventriculi venis inprimis infarctus inducunt.

Vita sedentaria, incongrui corporis sedentis situs, abdominis compressiones externae cum aliqua constantia aut diuturnitate applicatae, arctiores, quibus elegantior sexus utitur, thoraces, liberum sanguinis in abdomine circuitum impediunt.

Studia immoderata, vigiliae nimiae, praecocia, intemperantia veneris exercitia, ut corpori in universum robur detrahunt, ita & infarctibus ansam suppeditare observantur.

Excretionum sanguinearum, lochiorum praecipue, mensum, haemorrhoidum, suppressiones intempestivae quam facillime huic malo viam pandunt. Idem dicendum est de februm intermittentium imprudenti suppressione per corticem peruvianum aut aliud quodvis remedium, de opiatis, narcoticis, adstringentibus medicamentis imprudenter usurpatis f).

Aquarum

f) ~~HAEMORRHOID~~ de inf. vas. ventriculi, §. 15. p. 18.



Aquarum mineralium ingurgitationem liberaliorem, laxantia repetitis vicibus propinata, purgantia drastica, vomitoria incaute sumta, absorbentium terreorum abusum, inter causas infarctuum vasorum ventriculi procatarcticas refert *Cl. KAEMPFF*, suis aliorumque nixus observationibus g).

Vapor carbonum, ex ignitabulis pedibus subjectis, sub mensium fluxu genitalibus admissus ad uteri infarctus disponit h).

E censu rerum praeternaturalium notatu dignissima causa procatarctica est atrophia, sive glandularum mesentericarum obstructio, quae quum chylo viam praecludat, corporisque nutritioni obsit, & partium solidarum debilitatem, & fluidarum vitium facit, atque ob glandularum immanes saepe tumores, venarum mesentericarum pressionem simul importat, itaque non uno tantum respectu hujus mali generationi favet.

X. Haecenus infarctuum indolem, genesin, sedem causasque perlustravimus, nunc eorum effectus morborum, quos ex-
erunt in corpore humano, sunt investigandi. Ex illorum indole ac sede facile patet, in abdomine & visceribus chylopoiëticis varia ex iis oriri mala; bilis enim, liquoris gastrici, succi pancreatici, lymphae intestinorum, glandularum mesentericarum, secretiones, excretiones, permixtiones impediunt; nervos vicinos, aliasque partes adjacentes premunt, varie pro rerum circumstantia afficiunt; hinc sequuntur & deduci debent: digestio, chyli elaboratio, labefactatae: assumptorum corruptio: cardialgiae; flatulentia: spasmi: dolores intestinorum varii: alvi tarditas, obstructio pertinax; haec omnia vero si diu duraverint, humorum dyscrasiam aliaque per totum corpus diffusa incommoda ingignunt.

Effectus in genere.

XI. Completi infarctus venas, quas occupant, perfecte obstruunt (II.) hinc sanguis venosus, qui transire deberet, ad alias relabit venas, eas distendit, stagnat, atque sic malum sibi ipsi pro pabulo est. Praeterea vero & sanguini arterioso per

g) l. c. §. 14. p. 17. 18.

h) de Concrementis uteri §. 14. p. 15.



per aortam, coeliacam atque mesentericas arterias adveniēti notabiles resistentias opponunt modo nominati infarctus, hinc sinister cordis ventriculus aegre evacuatur, sanguis ex pulmone adveniēns cordi non infundi, neque ille ex dextro cordis ventriculo per arteriam pulmonalem satis propelli potest, ergo in utroque cordis cavo, pulmonibus, & in ipsa vena cava & circa ejus radices in hepate accumulatur, unde anxietates fere intolerabiles, cordis palpitaciones, pulsuum inaequalitates oriuntur. Subsistentibus vero hisce obstructionibus viarumque impedimentis, sanguis saepe per alias arterias, ubi minor aut nulla est resistentia, eo majori impetu & celeritate ruit, atque varia molimina & dispositiones ad haemorrhagias, congestiones in capite ac pectore, aliosque plethorae effectus producit.

XII. Alius adhuc recenseri meretur modus, quo infarctus morbos inducere valent. Fieri non potest, quin sanguis ad vasa infarcta delatus, aliquas subinde infarctuum particulas abripiat, pro diversitate materiae infarciētis varias, crudas tamen, neque humoribus nostris assimilandas. Hae tum cum omni sanguinis reliquorumque humorum massa in circulum abeunt, eam inquinant, dyscrasiam vel jam natam ex causis (X. XI.) augent, vel primitus inducunt statum cacochymicum, multis morboris phaenomenis portam pandentem, neque ulla medicatione tollendum, nisi ejus fomitem exstinxeris antea.

XIII. Maxima denique, respectu infarctuum eorumque effectuum, consideratione dignus est consensus nervorum, quem abdominis viscera cum toto fere corpore alunt, mediantibus intercostalibus & vagis nervis; Horum scilicet rami atque plexus, vasis abdominis & arteriosis & venosis vicini, circaque ea ludentes, ab hisce infarctibus pressiones atque irritationes patiuntur, ut hinc inde in abdomine spasmi excitentur, qui, secundum legem illam microcosmicam; quod spasmi membranis nervosis insidentes, per universam saepe nervorum ac membranarum compagem pro-

propagantur i) in remotis locis, sub variis & multum saepe inter se diversis scenis suam ludunt tragoediam. In universum quidem, dum corporis canales tubulosque arctant & stringunt, humorum circuitum, secretiones atque excretiones turbant; sic renum tubulos constringendo, excernendas salinas, terrestres, sulphureas particulas in corpore retinent, urinamque faciunt pallidam; ad universam corporis peripheriam propagati, perspirabili Sanctoriani vias claudunt, quin & excrementitias particulas ad cutem jam delatas, in humorum massam, partesque nervosas repellunt atque amandant. k) In pectore asthmata, cordis palpitationes tremoresque, &c. in capite cephalaeas, sensuum & internorum & externorum varias turbas excitant, in artubus motus inducunt convulsivos.

Ea etiam in genere spasmorum est indoles, ut iis, quas occupaverant, partibus insignem inducant debilitatem, stasque redire soleant periodis, unde quidem varia mala sequi posse, quilibet perspiciet.

XIV. Ex his (X. - XIII.) generatim allatis patet, qui qualesve affectus ex infarctibus venarum abdominalium propullulare possint? non vero putandum, ac si omnes enarrati morbi illos presso pede sequantur necessario; pro subjectorum enim sexu, aetate, corporis habitu, vivendi genere, diversis, diversa etiam inde sequuntur mala, diversoque incedunt tramite. Sic e. g. feminae atque personae sensibiliores omnino citius ex hoc malo aegrotant; quibus vero habitus corporis strictior est, atque fibrae tensae, quales sunt e. g. melancholico-cholericis, illi saepius magnae molis infarctus in abdomine abscondunt, pauca inde persentientes incommoda, semel vero excitato hoc malo, eo citius misere apoplexia, &c. jugulantur, observante KAEMPFFIO l).

Pro differenti sede, quam occupant, & effectus differentes sunt; sic, si in uteri cavo vel ejus vasis haereant infarctus, praeter ordinaria hysterica symptomata, immoderatas saepe uteri

i) F. HOFFMANNI Oper. omn. T. I. p. 168. §. 26. k) F. HOFFMANN l. c. §. II. p. 166. l) De infarct. Vas. Ventr. §. §. p. 8.



uteri haemorrhagias, mensium ataxiam, &c. producant; cardialgias vero vehementes & vomitus cruentos, si in ventriculi vasis delitescant; m) In Coli atque Recti vasis si stabulent, ea in scenam producant phaenomena, quae sub mali hypochondriaci nomine veniunt. n)

Cum vero plerumque, inprimis in diuturniore malo, non circa unicum tantum locum haereant infarctus, sed in amplio-rem diffusi sint sedem, fit, ut non una mali species, sed plures simul affligere soleant, & varie invicem combinentur vel succedant.

Quod au-
ctorum con-
sensu illu-
stratur.

XV. Quicumque nunc ea, quae haecenus de infarctuum indole atque effectibus breviter quidem potius perstrinximus, quam pro rei dignitate enodavimus, aequa pendet lance atque ulterius ruminatur: is sane intelliget, plurima tum acuta, tum chronica mala ex hisce venarum abdominalium infarctibus, tanquam e Pandorae pyxide, prodire, rebellia, scandalo medentibus futura, nisi veram hanc reconditamque nov-erint causam extirpaverintque; Febres certe mesentericas, acutas, inflammatorias o), hemitritaeas p) & lentas hecticas q), chronicas etiam atque refractarias tertianas, quartanasque, mesenterii abscessus, cum subsequenter dejectionibus, dysenterias saepe mentientibus r), pathemata porro hypochondriaca

m) KAEMPFF l. c.

n) KAEMPFF de Infarct. vasorum in infimo ventre; & in litteris privatis, ubi disertè haec habet: „Nos, met quotidiana experientia edo-
„cti sumus, fomitem huius mali
„confirmati semper fere in Sys-
„temate Venae portae delitescere, &
„potissimum in intestino colo &
„recto sedem suam figere, quorum
„in vasis multis ex rationibus san-
„guis facillime retardatur, incar-
„ceratur, & mora magis magis-
„que spissus redditus plenariam sta-
„gnationem concipit, imo non
„raro in polyposam massam abit.,

o) FR. HOFFMANNI Dissert. de febribus mesentericis, Halae 1728. §. 10. MATTH. MARTINI de morbis mesenterii abstrusioribus, Lips. 8. 1630. p. 45. & seq.

p) HOFFMANN, l. c. §. 13. & 14. SPIGELIUS de Semitertiana.

q) HOFFMANN, l. c. §. 22.

r) Mesenterium saepe fit sentina mul-
torum excrementorum, ac obtusi
sensus cum sit, diuturnas tolerat
affectiones, & in quo non raro
suboriuntur apostemata suppuran-
tia, qualia frequentissime a me
fuerunt observata, quae tandem
subsistebant per dejectiones puru-
lentas,

driaca s) atque hystérica, Chlorosin, sterilitatem t), varios affectus spasmodicos, epilepsiam ipsam, morbos articulares, calculique affectiones, vomitum cruentum u), morbum nigrum HIPPOCRATIS w), mentis etiam morbos, tristitiam, phantasiam depravatam, melancholiam, ipsamque maniam x) ex foecunda hac morborum minera promanare; & rationi & experientiae consentaneum est.

Verba Cl. KAEMPFFII huc spectantia, digna sunt, quae transcribantur: „His omnibus positis, inquit ille, in aprico „erit ratio, nec amplius indigebit documentis, quod totus „fere morborum apparatus ex infarctibus incunabula trahere „possit, & provido medico incumbat, inprimis in chronico- „rum curatione, semper has quandoque abditas causas respice- „re, nisi morbum palliative aggredi velit. Enim vero saepius „morbi causa in abdomine latet, quae vero tragoediam in re- „motis partibus, capite, pectore, ludit, & variis scenis, ce- „phalalgia, adfectibus soporosis, apoplexia, epilepsia, asth- „mate, scorbuto, nervorum affectibus, febribus intermitten- „tibus apparet, quae non cessabunt, nisi vera tollatur causa, „id est, nisi obstructiones, cursui sanguinis viam praeccluden- „tes, referentur, & ita impediatur, quo minus sanguis spis- „sus,

lentas, iterumque statutis tempo- ribus recurrebant & oblitescabant denuo per similes dejectiones non raro cruentas, ita ut imposuerint quibusdam, illas pro dysenteriiis habentibus. BENEDICT. SYLVA- RICVS Cent. II. Consil. 87.

t) Chlorosin atque sterilitatem a po- lypo vasorum uterinorum ortas insanabilibus adnumerat morbis. HOFFMANN in Op. o. T. I. p. 184. §. 21.

u) KAEMPFF l. c. §. 23. p. 23. & in al- tera dissert. de inf. vas. ventr. §. 5. pag. 7.

w) Eum describit HIPPOCRATES Lib. II. de morbis, circa finem pag. 486. Edit. Foës. Confer FR. HOFFMANNI Diss. de morbo ni- gro Hippocr. 1701.

x) BOERHAAVE l. c. de melanco- lia & mania; IVNCKERI conspe- ctus medicinae. Halae 1734. p. 231.

s) BOERHAAVE de cognoscendis & curandis morbis §. 1098. 1099. FR. HOFFMANN in Oper. o. T. III. p. 67. §. 16. RICH. MEAD Monita & Praecepta medica Cap. 17. & inpr. KAEMPFF in cit. disput. de infarctibus vasorum in infimo ventre.



„fus, acri materia refertus, versus dissitas etiam partes regur-
 „gitet, aut urgeatur. Persaepe enim experientia edoctus,
 „quod omnes enarrati morbi vel efficacissimis remediis non
 „cesserint, infarctuum vero minera mirando modo per alvum
 „atque urinam excreta plenarie propulsati fuerint. „ y)

Hisce magni BOERHAAVII consensus addi meretur, qui
 sub bilis atrae nomine infarctus descripsit, suamque de illis tra-
 ctationem his finivit verbis: „Ex quibus liquet, sanationem
 „hujus mali (sc. mali hypochondriaci & melancholiae) abso-
 „lutam esse in curatione bilis atrae, atque inde peti debere
 „non hanc modo, sed infinitorum, falso pro incurabilibus
 „haborum morborum. „ z) Cum his ea conveniunt, quae
 FERNELIVS a), HENNINGER b), SALZMANNVS c),
 STAHLIVS d), HOFFMANNVS e), & qui non alii? in genere
 de hac morbi causa differuerunt, licet forte horum infarctuum
 rationem non penitus perspectam habuerint, vel saltem non sa-
 tis determinaverint.

Infarctuum
 effectus in
 specie sunt:

XVI. Quamvis vero omnes hos morbos explicare, eorum-
 que suppeditare aetiologiam, exercitationis academicæ, quin
 & virium mearum limites longe excedat non tantum, sed &
 a praesenti scopo alienum sit; aliquorum tamen rationes expo-
 nere conabimur, ut ea, quae in genere haecenus proposuimus,
 specialibus aliquot exemplis illustrentur.

Malum hy-
 pochondri-
 acum.

XVII. Ingens variorum & diversissimorum Symptomatum
 numerus, quibus malum hypochondriacum suam tragoediam
 ludit, sine dubio fecit, ut de hujus affectus causa, sede, in-
 dole

y) De infarct. vas. ventr. §. 7. p. 9.

z) l. c. §. 1117.

a) Pathol. L. VI. C. 7. in universa
 medicina. 8. Francof. 1593. p. 582.

b) De Depuratione Sanguinis per in-
 testina. Argent. 4. 1712. p. 15. 16.

& de Mesenterio. 4. Argent. 1714.
 §. 34. 37. &c.

c) De Vena Portae. 4. Arg. 1717.
 §. 21.

d) De Vena Portae, porta malo-
 rum. 4. Halae. S. III. p. 24.

e) Oper. omn. T. I. p. 167. §. 18. &
 passim alibi.

dole toties fuerit disputatum, & in diversum denique abierint auctores. Si vero omnia hujus mali phaenomena solícite invicem comparentur, infarctuum indoles effectusque expendantur solícitius, ac diversarum simul, quae in malo hypochondriaco adhiberi solent, curandi methodorum successiones considerentur: patebit sane, nisi me omnia fallunt, eos rem acutetigisse, qui protheiformis hujus affectus sedem causamque in vena portae, illiusque sanguinis non tantum stagnatione, sed & (inprimis ubi malum inveteratum jam est) concretione in polypos aliasque massas solidas polymorphas quaesiverunt.

Regeret forte aliquis cum FR. HOFFMANNO: quamvis sanguinis stagnatio in vena portarum pro mediata mali hypochondriaci causa agnoscenda sit, morbi tamen ac symptomatum rationem in ea quaerendam non esse, quia „haud raro „nulla in hypochondriacis adsit ad fluxum haemorrhoidalem „dispositio, & saepius cruor per venas sedales copiosissime „profundatur, absque insequenti mali levamine, testantibus „id observationibus a RHODIO f), CLAUDINO g), MONTANO h) allegatis., i)

Quamquam immortalis Viri effata nunquam sine veneratione audienda sint, monere tamen licebit contra hanc objectionem, 1) omnino ex sola sanguinis spissitudine omnia hypochondriaci affectus symptomata non sequi, neque ex illa explicari semper posse; sed insignis differentia est inter sanguinis spissitudinem, & inter infarctus. Sanguis, sicut spissus, utcunque tamen per vasa circulat; infarctus vero plenariam vasorum, quae obsident, important obstructionem, atque alia omnino producunt mala, quam quidem lentus sanguinis spissi circulus.

2) Haemorrhoidum phaenomena quod attinet, ea nostram sententiam confirmant potius, quam infringunt. Si causa morbi foret sanguis spissus solum, omnino largae per venas sedales haemorrhagiae levamen aegris deberent afferre; causa esset mobilis

f) Cent. II. Obs. 91.

g) Consil. 89.

h) Consil. 246.

i) F. HOFFMANN de malo hypochondriaco. Oper. T. III. §. 8. pag. 66.



mobilis & evacuetur sine dubio hac via; quia vero, praeter sanguinem spissum, & polyposae aliaeve massae solidae in vena portae continentur, non mobiles, haecque, secundum nostram mentem, veram morbi causam constituunt: oppido clarum est; nihil emolumenti ex tali evacuatione redundare posse in aegros; imo contrarium potius obtinebit in quibusdam casibus; cum abdominalia viscera, ob has vasorum obstructiones exsucca jam antea, hac ratione ulterius emungantur, nimiaeque exinanitiones, qualescunque sint, & quocunque modo fiant, obstructiones augeant, malum rebellius, curamque reddant difficiliorem. k)

Neque tamen ex his sequitur, haemorrhoidum fluxum nunquam esse salutarem, certis enim observationibus constat, hisce fluentibus aegrotos fuisse levatos, quin sanitati restitutos, sed id in eo tantum fiet casu, ubi causa morbi mobilis est, & ad evacuationem disposita.

Neque alterum phaenomenon, absens dispositio ad haemorrhoides in hypochondriacis, nostrae sententiae contrarium est. Quamvis enim haec dispositio in istis aegrotis rectissime ab infarctibus venae portae deducatur; inde tamen minime sequitur, eam semper & in omnibus hoc malo affectis adesse debere. Possunt infarctus & penuria humorum una adesse, potuit sanguinis abundantia per praegressas, quae in hoc morbo institui solent, evacuationes admodum esse imminuta, ipsi infarctus, in intestini recti venis haerentes, sanguinis profluvio portam praecludere valent; & quae non aliae conditiones in Corpore existere possunt, quae sanguinis fluxum versus alias partes potius, quam venas sedales, dirigunt atque derivant?

Vomit
cruentus.

XVIII. Frequenter occurrit quaedam Vomit cruenti species, qui haud incongrue vomitus hypochondriacus vocari posset, ob causae & symptomatum affinitatem cum affectione hypochondriaca. Adsunt enim tensiones, pressionēs, dolores gravativi circa ventriculum & epigastricam regionem; oesophagus

k) KAEMPFF de inf. Vas. ventr. §. 10.

oesophagi spasmodicae contractiones, nauseae, vomituritiones: muci, seri rejectiones, mane inprimis; nunc molesta oris fauciumque siccitas, nunc ptielismus periodicus; appetitus modo auctus, modo imminutus; cordis palpitationes, anxietates: alvus adstricta: urinae pallidae: interdum molimina haemorrhoidalia: mensium turbae. Haec phaenomena interdum per annos in scenam prodeunt, eamque claudit denique vomitus sanguinis, utplurimum grumosi, picei, nigri; subinde etiam floridus rejicitur. Facta hac evacuatione modo recensita symptomata ordinarie ad tempus cessant, brevi tamen reditura, atque utplurimum recidivante Vomitu terminanda.

Vomitus hic & reliqua eum comitanti phaenomena pro fundamento agnoscunt, vel ipsum venarum ventriculi infarctum, vel saltem sanguinis accumulationem in illis factam, ortamque abs vicinarum venarum obstructione. Quamvis enim vulgo hepatis, & inprimis, ex antiqua hypothese, lienis indurationes in hoc affectu accusentur, sectiones etiam practicae subinde hanc sententiam confirmant; aliis tamen inspectionibus cadaverum hoc morbo defunctorum constitit, vasa ventriculi fuisse infarcta, hepate atque liene bene se habentibus. Conf. §. VI.

Si in eminentiorem gradum adoleverit hoc malum, affectum constituit, quem morbum nigrum HIPPOCRATIS vel bilem atram turgentem vocarunt medici; tunc plerumque funesti exitus solet esse. 1)

XIX. Particulae heterogeneae, ab infarctuum minera abrep- Morbi cal-
tae, & cum sanguine circulum obeuntes, (XII) si ex quadam culosi, arti-
corporis dispositione ad renes perveniant, atque in eorum vasis culares.
aut

1) Praeter aliquas supra (VI) recensitas observationes quae inprimis historiae circa hunc ventriculi affectum, funestumque illius exitum legi merentur, quarum altera extat in *The Appendix to the London*

Magazine 1750. & Chirurgi cujusdam Smith morbum sectionemque practicam continet; alteram suppledit Cl. BARON in *Memoires de Mathematique & de physique présentés à l'academie royale des Sciences*, Paris 4. 1750. T. I. p. 383.



aut tubulis bellinianis haereant, pathemata nephritica produ-
cunt, quin veri calculi principia ponunt.

Pone, easdem particulas ferri ad articulorum glandulas & vascula, robore suo naturali destituta, haerebunt eae pariter, non modo rhevmaticos dolores gignent, sed & verae arthriti-
di & podagrae, nodosae olim futurae, occasionem causamque suppeditabunt; praesupposito scilicet eo corporis habitu, qua-
lem praesupponere licet in iis, qui ad morbos articulares dispositi sunt.

Diversos hosce morbos ex uno hoc eodemque fonte prove-
nire subinde, verosimillimum est, quod mutuum saepissime
inter se nexum, alternantesque habeant paroxysmos; quod
uterque affectus frequenter cum malo hypochondriaco vel hae-
morrhoidalibus pathematibus complicetur; quod tophi poda-
grici calculique renales ejusdem fere sint naturae, atque arthri-
ticorum urina similis indolis calcem contineat m).

Plus quam probabilem reddunt hanc sententiam curationes,
juxta methodum infra enarrandam adornatae, quibus id effe-
ctum est, ut hypochondriaci & haemorrhoidarii non tantum,
sed & aegri arthritide aut calculo laborantes materiam gypseam,
imo calculos ipsos (absque ulla abscessus suspicione, aut dolo-
ris illius in hypochondrio dextro, qui felleorum calculorum
comes esse solet, praesentia) una cum polypis & concretioni-
bus carni similibus per anum reddiderint, atque amissam re-
cuperaverint sanitatem n).

Vomitus
calculosi in
nephritico
singulare
exemplum.

XX. Egregie hoc thema illustrat vomitus calculosus, quem
expertus est gallicus superioris seculi medicus H. RVFVS. La-
borabat is per quadriennium saevissima nephritide, sine sensibili
renum

m). Memorabilis historia extat in
Etrennes mignones 1753. de arthriti-
co, qui spatio 8. vel 9. mensium
60. vel 70. libras materiae cretaeae
per urinam reddidit. Albam cal-
cem in lotio reperiendam pro cer-
to signo diagnostico arthritidis va-

gae habet medicus anglus Cl. CLERK,
quo sc. haec abs rhevmatismis di-
stingui possit; vid. I. PRINGLE
*Observations on the diseases of the Ar-
my, &c. London. 8. 1752. p. 187.*

n) vid. KAEMPF de infarctu vas-
ventr. §. 5. p. 7.

renum vel hepatis intemperie calida o), sensim tamen ab ea liberatus fuit, usu aquarum vitriolatarum Aurelii apud Dajenses; sed vix calculos arenasque emingere cessabat, cum in crudelissimos sinistri lateris cruciatus incideret; dolor urgebat sub costis circa lienem, brevi spatio circumscriptus, ad ventrem & umbilicum se non extendens; alternatim compatiebantur ren sinister & regio ventriculi sinistra, instante inprimis vomitu. Ad decimam diem extendebatur primus paroxysmus, alvo interea non suppressa, ut in colico dolore, neque repressa, ut in nephritide; urina, quae mingebatur copiosa, crassa, turbida, lateritium pulverem, brevi matulae fundum petentem, continebat. Ter quaterve prima hyeme redibat paroxysmus; in auxilium vocata fuere remedia, quae colico dolori opponi solent, uno omisso balneo, a quo pessime se habuit aeger in principio.

Sub tali paroxysmo infestabant, inter cetera symptomata, anxietas praecordiorum & gravis cardialgia, quas excipiebat vomitus frequens & laboriosus cum copiosa, jejuno etiam ventriculo, rejectione materiae e rubro nigricantis, crassae tenacisque, hanc bacillo agitans æger, calculos invenit cineritios & subflavos, quales per urinas primo excreverat, talesque non semel tantum, sed toties deprehendit rejectos cum reliqua materia corrupta, quoties vomebat magno labore & conatu, vel descriptus dolor repetebat. Anno sui morbi postremo 1645. (quo scripsit auctor hanc observationem) dolores sensim mitiores facti fuere, ren parum doluit, sed magis, & longiore intervallo, lien & ventriculus, hujusque regio inprimis sinistra p).

XXI.

o) Verba auctoris, proprio calamo suum morbum delineantis, servamus maxima parte.

p) L. RIVERII Opera omnia fol. Lugd. 1679. p. 566. Obs. 6. Admodum brevis subinde datur via a venae portae systemate ad cavam, renalesque venas, & vice versa; dum interdum inter harum alteram ac

ramum splenicum communio observetur, mediante canali valvulis prorsus destituto, a renali vena oriente, & in gastricam sinistram dehiscente, quae una cum gastroepiploicis & epiploicis sinistris splenicæ venae immittitur. Talem observationem descriptam dedit Cl. SCHMIEDEL in Libel. de Varietibus vasorum p. 26.



Uteri infar-
ctus, eorum-
que phaeno-
mena.

XXI. Uteri infarctus, siue haereant in ejus vasis, siue in ipsa cavitate, siue in hac & illis simul, varia producunt symptomata. Sanguis, qui menstruatim excernitur, fibrosus est, glutinosus, subinde putridus, fluit modo largius, modo parcius; Urina mingitur incocta, tenuis, pallida, modo majore, modo minore quantitate. Abdomen tumet tumore, plus minus magno, aequali vel inaequali, & duriore; mammas replet liquor, lac aemulans, etiam extra graviditatis statum. Adsunt praeterea phlogoses, palpitationum cordis crebriores & repentini insultus: anxietates: pressiones doloresque, veros spuriosque parturientium dolores mentientes, & nonnunquam sub his ipsis moliminibus dolorificis excernuntur membranacea, polyposa, cartilagineam subinde substantiam duritiemque referentia, concrementa, a veris molis omnino diversa. Neque rarus est in hoc affectu ipsius uteri, vel etiam vaginae, prolapsus.

Graviditas modo revera adest, modo adesse putatur, ob abdominis mammarumque turgescientiam; plurimi tunc interest, ut medicus veram discernere satagat abs apparente, sollicite pensitando & praesentia phaenomena, & antecedentia, non neglectis iis signis & explorandi modis, quae ars obstetricia suppeditat.

Infarctuum
Prognosis.

XXII. Ex his (§. XVII - XXI.) allatis speciminibus dispalescit, plurimos eosque diversissimos affectus ex una eademque hac causa morbifica provenire. Plura, quae huc spectent, silentio praetermitto, paucis nunc infarctuum Prognosin expositurus.

Recentiores si sint, neque in nimis solidam massam compacti, facilius expugnantur; favent etiam prognosi aetas junior, vires vitae vigentes, sanguinis boni humorumque in universum laudabilium sufficiens copia: E contrario infarctus inveterati, materia infarciens solidior, polyposa, cartilaginea, lapidescens, copia & mole abundans, vires fractae, aetas provector, corpus exhaustum, cacochymicum, difficiliorem & diuturnam, quin subinde impossibilem, curationem faciunt.

In genere tempus, quo cura absolvatur, in antecessum definiri certo nequit; dependet illud non solum abs memoratis infarctuum qualitatibus, sed & ab aliis aegri conditionibus, quae resolutionem atque excretionem infarctuum promovere aut retardare possunt.

Complicati cum aliis morbis, horum curationem reddunt difficillimam, quin impossibilem, nisi prius ipsi eliminentur. Sic luem veneream praestantissimis auxiliis frustra oppugnatam, infarctibus vero eradicatis feliciter curatam vidit C/. KAEMPFF q).

Interdum natura pro medico fuit, prodeunte per totam corporis peripheriam scabie foetida, elephantiasin nonnunquam aemulante, vel excretionibus salutaribus per urinae vias, vel sanguinis rejectionibus *ανω* & *κατω* factis.

Si intra vasa adhuc integra & illaesa substiterit materia infarciens, atque convenienti methodo fuerit resoluta: cum omni subsequenti perfectae sanitatis spe evacuatio procedit; si vero, acris reddita, vasa sua ruperit, vomitum cruentum, similesve dejectiones per alvum fecerit, hae quidem excretiones sub appropriatorum remediorum usu absolvuntur cum evphoria, metus tamen est, ne hydrops aut febris hectica superveniat r). Idem periculum imminet, si malum inveteratum frequentioribus purgationibus, medicamentis calidis, sanguinis missionibus largioribus vel frequenter repetitis, oppugnatum fuerit.

In specie vero uteri infarctus, simili methodo turbati, non tantum scirrhus & hydropes faciunt, sed & frequenter abeunt in uteri exulcerationes, canculosque immedicabiles; urgentibus vero spasms, abdominis refrigeratione, vehementiori animi commotione vel venere accedentibus, lethalem uteri inflammationem producant; si in putredinem abeant, & hanc utero communicant, quae deinde funesti plerumque exitus esse solet. Orificio uterino adhaerentia concrementa, partum reddunt diffi-

q) de infarctu vasorum ventr. §. 7. r) F. HOFFMANN de morbo nigro HIPPOCRATIS §. 13. KAEMPFF l. c. §. 17. p. 21.



difficillimum. Saepius sterilitatis, saepissime vero abortuum causa sunt s).

Malum etiam curatione majus est, si materia infarciens in venae portarum systemate acerrima facta, putredine corrupta, vasis ruptis, exesis, visceribus scirrhis, per superiora & inferiora evacuatur; tunc vero ex praegressis crebrioribus materiae nigrae, piceae, foetidae rejectionibus, praesentibus vomitibus enormibus, doloribus, virium languore, ructibus foetidis, singultibus, instantem mortem denunciato t)!

Cum autem subinde diu in corpore latitent infarctus, absque incommodis admodum insignibus vel periculosis visis, aegroti saepe per plures annos symptomata nunc exacerbata, nunc vero ad tempus remittentia experiantur, atque variis palliativis medicationibus malum mitius evadat ad tempus: verae curationis neglectu accidit, ut morbus altiores agat radices, difficilioris fiat curationis, quin eam subinde superet. Hinc igitur vera curatio negligenda vel differenda non est, cum admodum raro salutaribus naturae conatibus malum curetur, sed ut plurimum gravioribus chronicis morbis, vel ipsa denique morte, terminetur.

Methodus
medendi.

XXIII. Nunc ipsa methodus medendi recensenda est; ita vero circa ejus expositionem versabimur, ut abstrahendo ab iis, quae in singularibus affectibus, abs memoratis infarctibus oriundis, agere convenit, generales ipsos infarctus curandi indicationes & remediorum enumerationem suppeditemus praecipue, deinde vero breviter aliquas cautelas regulasque in specialibus morbis observandas proponamus.

Indicationes sunt: 1) infarctus resolvere, 2) resolutos eliminare, 3) eliminantium reliquias morbosas sanare, & 4) novam eorum genesin praecavere.

Circa primam indicationem id statim animo medentis observari debet, in hoc malo non spissum tantum sanguinem, sed fortiora

s) conf. Disp. de Concrementis uteri. t) KAEMPFF de inf. vas. ventr. §. 17 p. 21.

fortiora coagula esse resolvenda, morbi vero naturam & sedem non nisi lentam curationem & mitiora medicamenta admittere. Unde ergo adparet, talia applicanda esse remedia, quae lente quidem agant in infarctus, nihilominus tamen illos sufficienter resolvere valeant. Omnibus vero indicationibus, sub quavis curae periodo, ita satisfaciendum est, ut simul potiorum symptomatum respectus habeatur, iisque adferatur medela.

Hisce finibus ex asse respondent enemata resolventia, quae **Enematum** ad libram dimidiam vel integram, post alvi exonerationem, **usus,** quotidie infundi, retineri, & per sat longum tempus continuari debent. Parantur illa ex herbis & floribus emollientibus & solventibus, amaris, e.g. Hb. malvae, verbasci, beton. hederæ terrestr. absinth. Rorismar. trifol. fibr. &c. Fl. Chamom. verbasci, Hb. c. fl. arnicæ, &c. quae cum furfuribus vel simplicibus, vel leviter ustulatis, in sufficiente quantitate aquae fontanae decoquuntur, & infunduntur, absque salis vel olei admistione.

Ideo vero prae aliis remediorum formulis huic indicationi satisfaciunt enemata, quia per venas bibulas resorbentur, morbi sedi applicantur immediate, eumque, ut in sequentibus monstrabitur, ob vaporis aquei virtutem solventem, satis efficaciter aggredi atque eradicare valent.

XXIV. Quod enemata resorbeantur, docet usus clysmatum **Resorptio,** **nutrientium HIPPOCRATI t), CELSO u), CAEL. AVRELIA-** **NO w),** aliisque veteribus medicis haud ignotus, totque recentiorum **MORGAGNI x), FREINDII y), GARENGEOTI z),** & **VAN SWIETEN a)** observationibus confirmatus, ut de rei veritate dubitare haud liceat. Idem demonstrant clysmata inebriantia,

t) Memorabilis locus extat in Libro de salubri victus ratione, p. 338. infra medium. Ed. Foës.

u) L. III. C. 19. p. 150. & L. IV. C. 15. p. 225.

w) de morbis acut. L. 37. p. 170. de morbis chron. C. 3. p. 508.

x) Advers. anat. III. animadv. XVII. p. 31.

y) Histor. medicin. p. 499.

z) Operations de Chir. I. p. 190.

a) Comment. in Boerh. aphor. T. II. p. 691.



ebriantia, de quibus RHODIVS b), HOMBERGIVS c), SAN-
TORINVS d) & ACTA ANGLICANA e) exempla suppeditant.
Huc etiam facit effectus febrifugus enematum chinatorum,
quem laudant viri fide dignissimi, BAGLIVVS f), HELVE-
TIVS g), WERLHOF h), V. SWIETEN i), &c. In sphaceli
atque variolarum curationibus MONROO ea depraedicat k).

Quoniam vero ex hisce observationibus aequè pro vasorum
lacteorum quarti generis WINSLOWII, ac quidem pro vena-
rum mesentericarum resorptione argumentari liceat: alia pro-
ferenda sunt, quae stricte hanc posteriorem confirment, argu-
menta. Huc equidem traho illa experimenta anatomica, qui-
bus constitit, materiam ceraceam, aquam, variosque liquores
venis mesentericis infusos in cavum intestinorum penetrasse l).
Venis haemorrhoidalibus injectam ceram vel aquam in crassa
intestina exiisse notavit *Cel. KAAV* m). Ex hac igitur viae li-
bertate, quae venas mesentericas & intestina intercedit, ex
communi venarum officio & venularum capillarium proprie-
tate non immerito concluderunt Physiologi, venas mesentericas
resorbere liquidum ex intestinis.

Ad oculum, ut ajunt, demonstrant hanc veritatem expe-
rimenta, quae ipsam hanc resorptionem oculis spectandam
praebuerunt. Sic ex jejuni & ilei cavo olea aetherea facilem
transitum in venas mesentericas consecuta esse vidit I. M. HOFF-
MANNVS n). Spiritum vini eandem fecisse viam experimento
cognovit MERYVS o), & simile experimentum in intestinis
crassis successisse affirmat p).

b) *Observ. med. Cent. I. obs. 38.*

c) *Hist. de l'acad. r. des Sciences. 1700.*

d) p. 125.

e) p. 598. cit. HOFFMANN. Op. T. I.
p. 468.

f) *Prax. med. L. I. C. 13. §. 9.*

g) *Methode de guerir toutes sortes des
fièvres sans rien prendre par bouche,*
p. 4. seq.

h) *Observ. de febribus. 4. Hannov.*
1745. o. 78.

i) *Comment. T. II. p. 567.*

k) *Essais d'Edimbourg. T. V. art. X.*

l) BRUNNER de glandulis duodeni p. 61.

HALLER *Comment. in Boerh. I.*
p. 849. n. 4. KAAV *Perspiratio*
dicta HIPPOCRATI, 8. Lugd. B.
1738. §. 466. 467. 473.

m) l. c. §. 474.

n) *Dissert. anatomico-physiol. in VAN*
HORNE microcosmum. 4. Alt.
Nor. 1685. §. 27. p. 105.

o) PANTONVS *Dissert. anat. p. 124.*

p) *Histoire de l'acad. r. des Sciences, 1717*

Palpabilia atque omni exceptione majora sunt *ill.* KAAVII experimenta. Is aquam tepidam ventriculo canis statim post mortem incisi infusam a venis bibulis resorberi, venas gastricas ingredi, venae cavae reddi, atque ex ea prope cor incisa effluere vidit; porro observavit, aquae infusione continuata per horas, denegato simul per oesophagum exitu, aquam intestina replere, eamque ex his a venis mesentericis resorberi, venae portarum tradi, ut tandem ventriculus & intestina, linteï instar, pallesterent, heparque ipsum exsanguie redderetur q). De resorptione, quae fit in intestinis crassis, disertis verbis haec habet: „Venulae ex intestinis crassis osculis suis resorbent, in vivis, ut ex tenuibus, nisi quod venulae hae pauciores, at simul & capaciores sint r).

XXV. Non jam disquiram, an clysteres etiam per intesti- Transfuda-
norum parietes porosque transfudare possint? Simile quid suspi- tio per po-
care videtur *Cel.* TRILLERVS, his verbis: „Nec dubium de- ros intesti-
„nique plane est, quin blandi vapores & anathymiascs alibiles norum.
„clysterum nutrientium per *ipsos intestinorum poros*, aliasque
„caecas adhuc & abstrusas vias & vasa quaedam resorbentia,
„imbibentia & attrahentia, ob immensam sui subtilitatem,
„nobis, ut mille alia, hucusque forsan incomperta, ad sangui-
„nem ipsum deferri possint, sicque vis illa alimentaria venis
„arentibus & marcentibus in irrigationem ac refectionem tem-
„pore summae necessitatis benigne infundi queat s).

Eandem suspicionem fovet toties laudatus KAEMPFF t), eamque probabilem fieri credit ex BAGLIVI observatione, qui lotionem ex jussulo carnis & oleo amygdalarum dulcium infusam, per siphonium retentam, tandemque totam cum urina excretam vidit, ut nihil per alvum secederet, oleumque lotio innataret u). Sed quicquid veritatis huic opinioni insit, id certum est, poros, qui vasorum oscula non sint, haftenus per ex-

q) l. c. §. 469 - 471.

t) de infarct. vas. ventr. §. 23. p. 27.

r) l. c. §. 474.

s) Progr. de clysterum nutrientium u) Dissert. varii argumenti, in Oper. antiquitate & usu. 1750. p. 12. p. 585.



perimenta demonstratos non esse, laudatamque observationem cum multis aliis similibus ex vasorum exhalantium atque inhalantium functionibus posse intelligi atque explicari; cum ergo certae, & experimentis demonstratae, viae venarum resorbentium, explicandis & intelligendis clysmatum effectibus sufficere mihi videantur: has minus certas elabendi rimas non admodum urgeo, neque tamen plane negandas esse existimo.

Quomodo
clysmata
Iæ Indica-
tioni satis-
faciant?

XXVI. Itaque per memoratas venas resorbentes enemata resorbentur, atque sub specie tepidi vaporis infarctibus applicantur immediate. Nihil vero ad duriora concrementa animalia resolvenda aptius est vapore aquae tepido, quod experimento cum Cornu Cervi facto facile demonstratur, hoc enim, si vapor tepido aquae exponatur, ita mollescit, ut cultro, gelatinae instar, scindi queat, quin sponte diffuat fere w). Haec enim aquearum particularum proprietas est, ut sese inter corporum elementa & particulas insinuent, docentibus id experimentis physicis: chartarum laciniae aqua madefactae sexta fere parte fiunt longiores x), coria aquae immissa pariter elongantur y), atque hygrometrorum chordae a vaporibus ex aëre humido haustis intumescunt.

Dum vero aqueae particulae corporum ipsis expositorum elementis se interponunt, haec a mutuo contactu remonent, & cum ipsae parum inter se cohaereant, corporum cohaesionem necessario infringunt, ea emolliunt ac solvunt. Si ergo diuturno clysmatum usu tepidus vapor per longum tempus jugiter his infarctibus applicatur, fieri non potest, quin eorum cohaesio magis magisque infringatur, ac tandem plane esse desinat.

Quid ulterius prae-
stent?

XXVII. Interea vero dum hac ratione clysmatum usu primae indicationi satisfacit; ea egregios quoque effectus in intestinis reliquisque infimi ventris visceribus exerunt, atque simul potentiora concomitantia symptomata optime superare valent. Eae

w) V. SWIETEN Comment. L. P. 39. 46.

x) *Memoires de l'acad. des Sc.* 1714. p. 72.
y) *Wolffens Versuche* II. §. 98.

Eae enim, quas commendavimus, lotiones intestinis infusae, ea abstergunt, blanda mucilagine demulcent, variam in illis haerentem amurcam, fecesque diluunt, corrigunt, emolliunt atque evacuant, fibras intestinorum siccas & spasmo affectas irrigant & laxant: intestina quoque tenuia, ventriculū, lienem, nervos, vasa omnesque partes, quas amplissimum colon vel circumdat, vel tangit, amico calore fovēt, sicque doloribus spasmisque medentur efficacissime haud secus, ut eleganter HOFFMANNVS ait, „ac vesica decocto emolliente repleta extrinsecus apposita, in magnis internarum partium doloribus, spasmis & inflammationibus levamen affert praestantissimum. z) Segniores praeterea, qualis in his morbis solet esse, alvum blande stimulant clysmata, motumque intestinorum peristalticum in universum in ordinem reducunt, & dum vasa abdominalia blando calore circumfundunt, eo derivant sanguinem, & consequenter noxias ejus a spasmis abdominalibus oriundas restrictiones versus pectus & caput impediunt. In sanguinis vero & humorum circuitum quoque clysteres agere, & ad excretionem movendas contribuere aliquid, non tantum ex subsequente pulsus immutatione, sed & ex perspirationis & urinae uberiori successu luculenter patet. a)

XXVIII. Clysmatibus certo sensu affinia sunt infusa theaeformia, ea enim praeter facultatem, sanguinem diluendi & resolvendi, & eam possident, ut venis ventriculi bibulis inhalata, concrementa polyposa in his & vicinis venae portae vasis nidulantia macerare, emollire ac resolvere queant. Huic fini ut respondeant, parantur ex radicibus herbis & floribus aperientibus atque solventibus, quales v. g. sunt Rad. Pimpinellae, gentianae, rhabarbari, taraxaci, caryophyllatae, &c. Hb. millefolii, hederæ terrestris, centaurii minoris, melissae, veronicae, &c. Flores primulae veris, chamomillae rom. bellidis, tiliae, &c. Herba cum floribus arnicae egregie resolvit,

Quem
usum ha-
beant infusa
theaeformia,

z) De balneorum, pediluviorum & clysterum usu medico. Op. o. T. I. p. 468. §. 24.
a) HOFFMANN l. c. §. 17. p. 466.



solvit, exhibenda vero est in refracta dosi, saltem in principio, cum frequenter cardialgiam faciat; hisce cortices aurantiorum, citri, vel cinnamomi exiguam dosin addere possumus.

& alia medicamenta interna?

XXIX. Clysmatibus & infusis theaeformibus commode junguntur alia interna medicamenta, quae resolvendo lenti sanguinis dyscrasiam corrigant. In horum censum veniunt varia antea jam memoratorum vegetabilium extracta, pilulae balsamicae ad mentem HOFFMANNI vel STAHLII confectae, pilulae de Gummi ammoniaco juxta Dispensatorium Wirtembergicum, gummi ammoniacum aceto squillitico solutum, omniaque gummi foetida, in pilularum forma, cum sapone veneto, exhibenda. Salia media: Tartarus vitriolatus, terra foliata tartari: refracta Kermes mineralis, sulphuris antimonii aurati ultimae praecipitationis dosis, pulverum formae conveniunt, cum radice ari praeparata, succino, &c. Si vero forma fluida praeferenda sit, praesto habemus tincturas antimoniales, liquorem terrae foliatae tartari, liquorem anodynum mineralem H. Essentias succini, pimpinellae, &c. quibus extracta etiam & pilularum massae in convenienti menstruo solutae admisceri possunt, talisque mistura guttatim propinari cum infuso theaeformi appropriato.

Horum insufficiens; enematum praerogativa, necessitas.

XXX. Quamvis vero recensita haec remedia interna praecleara sanguinem spissum, lente circulantem resolvendi & corrigendi polleant virtute: tamen infarctuum resolutioni vix ac ne vix quidem sufficere mihi videntur, utpote quam a clysmatibus tantum expectandam esse censeo, ob sequentes potissimum rationes:

1) Omnia per os assumta medicamenta liquori gastrico pancreatico, bili, muco, plerumque in hoc morbi genere corruptis viscidisque miscentur, iisdem obvolvuntur, sive etiam ob languentes digestionis vires non solvuntur satis, ergo vasa lactea venasque resorbentes subire non possunt, neque humorum massae admisceri, aut, si admisceantur, longa via per multas mutationes, alterata demum ad locum affectum mali qu

que sedem feruntur, unde non possunt non leviter tantum in illam agere; cum e contrario clysmata, evacuatis fecibus & absterfis intestinis, libere absque multarum heterogenearum particularum admixtione plenis viribus & breviori via advenientia, mali portam pulsant immediate.

2) Experientia constat, ejusmodi medicamenta interna omnia, eaque selectissima, in malo hypochondriaco inveterato aut alio quovis morbo, qui hosce infarctus pro fundamento agnoscit, frustra adhiberi, si non quotidianus clysmatum usus iis jungatur. b) Mitigatum ex eorum usu fuisse malum, plurimae morborum historiae docent, curationis plenariae nulla habemus exempla, aut rarissima, & in iis tantum casibus, ubi mitior mali gradus, simplex sanguinis spissioris aggestio (probe abs concrementis polyposis distinguenda) obtinuit, aut natura ipsa morbum sanavit.

Alleviationem vero afferre aliquando posse talia remedia interna, conceptu facile est, dum quorundam symptomatum causam proximam tollere valent; sed quam breves, quam fallaces sunt istae induciae! plerumque enim priora, aut alia interdum pejora, redeunt symptomata, manifesto indicio: fomitem mali extinctum non esse.

Probe id observarunt medici sagaciores, hinc, post longam in suis libris remediorum methodique medendi expositionem, abstinere jubent abs medicamentis, fatentes: Saepe plus praesidii

b) Hoc assertum innumeris fere confirmari posset observationibus, ex multis vero unicum medici cujusdam, Cl. HOPPE de se ipso testimonium seligam. Ich kan, ait ille, meine Leser versichern, daß ich bey meiner Hypochondrie fast nach allen Methoden curirt worden, nachdem die Aerzte, die ich gebraucht, dieser oder jener Theorie von dieser Krankheit beygepflichtet. So habe ich nicht nur die staerkenden Mittel, (visceralia)

die Gesund-Brunnen und süsse Molken mit grosser Gedult gebraucht, da man mich nach des Hrn. HOFFMANN'S Methode curirte, sondern ich habe auch die auflösenden und seifenhaften * v. Epicrigen Arzneyen, die BOERHAAVE, DE PAVVA* so anpreisen, mit starkem Vertrauen genommen. - de affectu ich verspürte von allen solchen Medicamenten keine Wirkung. Hambur- &c. Romae gisches Magazin, XI. B. pag. 344. 4. 1751. 345.



fidii in recto vivendi genere, corporisque exercitatione positum esse, quam quidem in hisce remediis. Hinc etiam MONTANI dictum: Fuge medicos & medicamenta, facileque convalesces!

Longe aliter de clysmatum usu quotidiano loquitur experientia. Certum est, asserit *Cl. KAEMPFF*, longa observatione edoctus, „quod in coagmentationibus illis filamentosis, fibrosis hic loci (sc. in venis abdominalibus) nidulantibus eliminandis omnia alia remedia incertos praestent effectus, & „in concretionibus illis gypseis sine clysmate lapis minime moveatur. Laudes hae, ita pergit *Cl. Auctor*, „omnino effectui respondent; haud enim pauci casus nobis obtigerunt, „ubi enematum usu quotidiano ejusmodi concrementa polyposa, pondere saepe libram integram & longitudine ulnam adaequantia, & formam vasorum retinentia, (adeo ut tyronibus imposuerint, putantibus, se videre partes solidas) nec „non conglobationes steatomatosas, ovi gallinacei magnitudine, & magnam copiam calculorum durissimorum per anum, „vel substantiae stagnantis quid magis resolutum per cutis poros, sudore foetidum spirante odorem, aut per renum tubulos, urina materia mucosa, filamentosa referta, & arenosa turbulenta adparente, summa cum euphoria evacuata observavimus. „ c) Observationes, quas modo laudatus vir in triginta saepius jam citatarum Dissertationum publici juris fecit, ad unam omnes hoc assertum confirmant, & similis successus specimina suppeditant. Ex illis inprimis ea huc pertinet, qua solis enematibus & radicis juniperi decocto vasorum ventriculi infarctus vomitumque cruentum se profligasse memorat. d) Huic similis est FORESTI observatio, qui se non alio quam Clysterum praesidio vomitus cruenti morbum curasse refert. e) Solo clysmatum ex amaris & balsamicis remediis confectorum usu desperatos hypochondriacos ad sanitatem se reduxisse testatur

c) De infarctu vasa. ventr. §. 24. p. 28.

d) l. c. Cas. 8. p. 35.

e) Libr. XVI. Obs. 24.

tur HERCVLES SAXONIA. f) Pro complemento probationum testem adduco medicum judiciosissimum, qui primo loco nominandus fuisset, *celeberrimum Severissimi Ducis archiatrum* D. D. REVSS; Ille scilicet inveteratis hypochondriacis hysterisque diuturnum clysmatum ex emollientibus & solventibus concinnatorum usum suadere solet, jubetque ea, pro re nata, bis in die infundere, eo fine, ut non solum alvus respondeat, sed etiam ut humores spissi in abdominis vasis visceribusque resolvantur.

Eo confidentius autem haec edissero, cum per integri fere anni decursum clysmatum effectus sedula & quotidiana observatione annotare mihi licuerit in hypochondriaco, qui per plures annos curae medicorum & eruditione & praxi clarissimorum frustra se commiserat, donec tandem ad quotidianum clysmatum usum ventum fuerit. Per trimestre autem tempus clysteres quotidie injiciebantur, absque ullo sensibili effectu; sed sub initium quarti mensis, oborta levi febricula, in toto dextro latere prodibant pustulae rubicundae, non nisi pruritu & levioris lassitudinis sensu molestae, intra octiduum, squamularum instar, decidentes. Interea vero, & inprimis paulo post, per alvum infarctuum materia evacuari coepit sub varia forma; polypi modo vasorum figuram exprimentes, modo quasi in ramenta discerpti aut in frustula dissecti, mucus tenax, sanguis ater, foetens, liquamen difficile dictu, acidum odorem spirans, sabulum & arenulae successive & vario tempore prodibant & fecum alvinarum excretionem sequebantur, alternando semper, ut exacte determinare & praedicere mihi potuerit aeger, qualis excretionum materia his vel illis diebus evacuanda sibi instaret. Per plures autem menses placide, & si levem lassitudinis sensum exceperis, absque ulla molestia procedebant hae excretiones, modo majori, modo minori copia, cum insigni omnium symptomatum, inprimis anxietatum, alleviatione, ut tum temporis, quo mihi discedendum erat abs aegro,

f) L. I. Prax. C. 16. conf. FR. HOFFMANN Op. omn. I. p. 467. & EL.

RVD. CAMERARIUS in Disput. de Clysmatibus. Tub. 1688. p. 28.

aegro, nullum de sanitate perfecte recuperanda dubium superesset.

3) Experientia & multorum seculorum observationes docent, lectissima quaevis remedia, judiciosissima principum medicorum administratione propinata, cordis aut pulmonum polypis resolvendis nunquam suffecisse; quae nunc quaeso ratio adesset, cur eadem remedia, quae talia concrementa in iis locis, ubi vegetior sanguinis motus favere posset, emollire & solvere non valent, illa in alio corporis loco, ubi sanguinis circulus etiam in statu naturali minus viget, solvere valeant?

Clysmatum vero vaporem id praestare posse, nemo dubitabit, si ea perpendit, quae paulo superius de calidorum vaporum effectibus in genere differuimus. Si pateret via, qua talis vapor medicamentosus polypis in cordis & pulmonum vasis haerentibus jugiter adplicari posset, ut potest hisce venarum concrementis, forsan de eorum resolutione desperandum non esset. Sed ponamus

4) Dari medicamentum per os assumendum, quod hisce concrementis polyposis solvendis sufficiat perfecte, illud sane corpori humano ingerere haud licebit. Omnia enim, quae ordinaria via in canalem alimentarem veniunt remedia, universae massae humorum miscentur, atque ipsi pro diversa, qua pollent, indole diversas inferunt mutationes, magis minusve sensibiles; caveri ergo non poterit, quin id, quod mente fingimus, remedium aequè omnem humorum massam mutet & solvat, ac quidem ipsum polypum; quae vero exinde oriretur humorum dissolutio & fusio antequam polyposi concrementi connexio turbaretur? Hoc bene perspexit Cel. Galliae Medicus HELVETIVS, qui de pertinacibus glandularum obstructionibus ita loquitur: *Quelquesfois l'humeur est fort épaisse & s'attache aux parois de ces vaisseaux, comme une espece de colle dure & tenace. - - Pour lors la guerison devient presque impossible: il n'y auroit pas même de prudence à la tenter. Car avant que de pouvoir fondre l'humeur endurcie, on courroit risque de jeter toutes les autres*

autres liqueurs dans une dissolution totale, qui termineroit bientôt la vie du malade g).

Felici itaque opportunitate clysmata omnes requisitas proprietates in se unitas habent; malorum enim sedi quam proxime adplicari possunt, in vapores resoluta, concrementa & corpora animalia efficaciter solvere valent, hancque resolutionem, ut naturae & rationi consentaneum est, lente peragunt, neque humoribus corporis humani ullam perniciosam inferunt mutationem, sed potius diluentis & resolventis medicamenti vicibus funguntur.

XXXI. Sed annon ex quotidiano & adeo diuturno clyste- **Dubia re-**
rum usu totius tubi intestinalis debilitas oritur? annon ille **moventur.**
ipse vapor, qui sub minimarum particularum forma vasorum concreciones subit ac solvit, etiam interi intestinorum fibras earumque elementa sese insinuat, & illa ipsa pariter a contactu removet? ad speciosam objectionem respondeo; omnino aliquam vaporis portionem fibris se insinuare, sed cum humiditate debita plerumque orbatae sint, earum vires erigere potius quam perdere. Non gratis hanc siccitatem, liquidique intestinalis penuriam suppono; ut taceam, quae ratiocinia suppeditare possent, argumenta, eam satis testantur feces siccissimae, exustae quasi, & molestus, de quo toties queruntur aegri, siccitatis & ardoris sensus in intestinis; Fibrarum vero debilitas tum demum orietur in hoc casu, si humidum inter earum elementa abundet. Pone nunc intestini membranas fibrasque vel domestico intestinorum liquido naturaliter repletas, vel infusa lotione sufficienter irrigatas esse: vix ultra aliquid admittent repleta fibrae interstitia, cum experimentis constet, non multum imbibere membranas jam madidas & humore saturas h), & multo expeditior tunc est via per venulas resorbentes, quas continuo subibit vapor, qui, quod ulterius monendum est, ex herbis resolventibus atque amaris etiam aliquid tonici

g) *Idée generale de l'Oeconomie animale,*
a Lyon 12. 1727. p. 155.

h) V. HALLER prim. Lin. physiol.
S. 757.

tonici haussit, quod roborare potius queat intestinale tubum, quam debilitare. Sed nodum in scirpo quaerimus, cum experientia optime hoc dubium refutet. Parum enim ego ipse fidens clysmatibus, sedulo in id animum intendi, ut, quae eorum usum sequerentur digestionis atque egestionis mutationes, experirer; sed sincere affirmare possum, ex quotidianis illorum infusionibus, quae saepius bis in die instituebantur, nunquam reddebantur, & per integri fere anni decursum continuabantur, nihil detrimenti redundasse in digestionis egestionisque officinas, quod si unquam, certe in hoc aegroto, evenire debuisset, cum habitus esset laxioris, neque admodum firmo fibrarum systemate gauderet.

Ponamus vero, oriri exinde aliquam intestinorum debilitatem, ea tanti momenti malum non esse videtur, quod ab extirpatione majoris mali detinere deberet medicum, facile enim illi medentur ea medicamenta, quae tertiae indicationi, & in specie languentibus digestionis viribus excitandis destinantur, de quibus paulo infra dicemus.

XXXII. Curiosa magis quam vera est illa objectio, quae nescio quam naturae consuetudinem causantur; dicunt, iterato clysmatum usu, alvum ita iis adsuefieri, ut, absque illorum admonitione, suo in posterum non fungatur officio. „Ratio (ita huic dubio respondet *Cl. KAEMPFF*:), & experientia contrarium probant, cum clysteres allegata methodo „concinnati glandularum ductulos, intestina crassa lubricantem & scybala indurata diluentem succum plorantes, aperiendo, constrictiones relaxando, &c. alvi functiones in aegris, „qui quotidie duos tresve sumserunt, potius in stabilem ordinem redegerint i).

Aliter omnino res se habet, si lotiones infundantur oleosae & pingues aut salibus impraegnatae. Olea enim, ob tenacitatem suam, intestinorum parietibus adhaerent, liquido intestinali exituro viam praecludunt, &, dum irritabiles fibras ob-

vol.

i) de infarct. vas. ventr. §. 25. p. 29.

volvunt, naturalem stimulum, quo feces per intestina crassa promoventur atque egeruntur, omnino impediunt. Salia vero, dum jugiter & plus justo stimulant, fibras quasi callosas reddunt, earumque irritabilitatem ita minuunt, ut, ad naturalem stimulum insensiles factae, fortiori omnino calcare admonendae sint postea. Hinc oleosa & salina enematum quotidianorum decocta exulare voluimus; si vero pro re nata oleum quoddam lotioni addere necesse visum fuerit, id fieri poterit absque damno, cum non fiat quotidie, & oleum, intestinorum parietibus agglutinatum, clysmatibus ex herbis resolventibus, amaris, &c. factis abstergi queat atque educi, testante KAEMPFFIO k).

Virium prostrationem & nescio quam debilitatem enematum usum sequi, vulgi somnia sunt, quae ridet sapiens medicus. In debilissimis quidem aegris ac iis, qui nervorum systema habent mobilissimum, enematum infusiones turbas excitare nonnunquam posse, non negaverim; sed suaderem in hoc casu, ut partitis vicibus exigua quantitate infunderentur, ad aliquot uncias tantum, addita olei amygdal. dulc. vel sirupi papaveris albi, vel alius medicamenti sedativi, aliqua portione; quae etiam cautela adhibenda est, si difficulter retineantur infusiones.

XXXIII. Ex haecenus dictis clysmatum praerogativa, necessitas ususque innocuus in resolvendis infarctibus. abunde patent. Pertinaciter itaque iis insistendum est, neque de felici eventu desperandum, licet elapsis aliquot mensibus infarctuum evacuatio nondum in conspectum prodierit, nam & hic gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo.

Quomodo
satisfaciendum
IIae indicationi?

Si vero concrementa excerni coeperint, tum omni sollicitudine haec salutaris evacuatio sustentanda, imo, quantum fieri potest, promovenda est, cavendo tamen, ne intempestiva sedulitate plus obsumus, quam prosumus. In hunc finem clysmatibus (quae & per hanc curationis periodum continuanda sunt) addi possunt aliquot grana pilularum balsamicarum, ad HOFFMANNI vel STAHLII mentem

mentem concinnatarum, vel etiam alternis diebus lene laxans rhabarbarinum propinare convenit. Est, ubi pilulis balsamicis commode extractum rhabarbari aquosum substituitur; si vero hac pilularum vel extracti additione clyisma rejici observetur, satius est ab iis abstinere, ne ejus effectum, quem expectamus, resolventem frustremur. Ex eadem ratione laxans semper aliquot horis post enematis infusionem hauriendum est, si enim citius propinetur, illud rursus eliminatum, ideoque frustra infusum fuisse plus semel observavi.

Egregie quoque infarctuum evacuationem adjuvat sufficiens & placidus corporis motus quocunque modo institutus, modo aegrotantium viribus proportionatus sit.

Frictiones abdominis, panno laneo mane & vesperi per horae quadrantem & ultra institutas, largiores semper concretorum evacuationes insecutas esse notavi. Memoratu quoque dignum est, largiorem paulo & frigidiusculum, sive aquae, sive vini, haustum admodum promptam & solito copiosorem excretionem sequi. Itaque pro diversa rerum circumstantia modo his, modo illis potius adminiculis ad expediendas & caute promovendas hasce excretiones uti licebit; inprimis vero eo animum intendere oportet, ut vegetus sit sanguinis & humorum motus, hoc enim vigente, optime excretiones expediuntur, non per alvum tantum, sed & per urinae & transpirationis vias.

Quomodo
tertia

XXXIV. Quod *tertiam indicationem* attinet, praecipue id est agendum, ut abolitus venarum, ab infarctibus ultra sphaeram elasticitatis dilatatarum, tonus restituatur, cui fini inserviunt iterum enemata, quae vero magis roborantia esse debent, & ex herbis atque radicibus amaris, leniter adstringentibus & aromaticis, addita convenienti quadam pilularum massa, concinnari possunt. Operae pretium etiam faciunt extracta amara, cum vino generoso in elixirii formam redacta cujus specimen habemus in Elix. stom. temp. HOFFM. Ne minus essentiae vegetabilium aromaticae, tincturae martiales trageae stomachicae, vina medicata, &c.

Si vero, ob infarctus inveteratos & incarceratos, vasa non modo dilatata, sed exesa fuerint; tunc omnino perfectam melam haud admittit malum, cum illa resarcire, artem medicam superet.

Interim tamen tentandum est, quid valeant enemata ex medicamentis balsamicis traumaticisque confecta; eam enim & heic praerogativam tuebuntur clysteres, quod plenius viribus immediate ad locum affectum pertingant. Saepe in hoc casu accidit, ut chronica & vix medicabilis excretio materiae mucosae, sabulosae, &c. per anum, uterum, urinae vias sequatur, quae, cum nullum sanitati detrimentum afferat, aegrique notabilem omnium phaenomenorum morbosorum imminutionem sentiant, sibi ipsi est relinquenda, neque contraria medicatione turbanda.

Eadem, quae *tertia* indicationi destinantur, praesidia, & *quarta*? *quarta* debentur, per sufficiens autem tempus medicamento- rum usum continuare decet; causae occasionales (IX.) vitandae sunt, observatis diaeta & regimine convenientibus.

XXXV. Omnia, quae haecenus proposui, in genere indicant, quae circa infarctuum curationem sint agenda; judicii & sapientis medici opus est, concinnare remediorum formulas, & dispicere, quae cuivis individuo conveniant; interim, ante quam diaetae & regiminis expositionem aggrediar, nonnulla, quae in specialibus casibus vel agenda vel fugienda sunt, breviter indicabo.

XXXVI. Omnes sanguinis ventilationes, quocunque eae fiant modo, summa cum circumspectione administrandae sunt. Oppido clarum est, infarctus completos, qui fixam sedem habent, venaesectionibus & hirudinum adplicatione neque loco moveri, neque resolvi posse; quin paulo largius aut repetitis vicibus administratae sanguinis missiones primariae indicationi, infarctuum scilicet resolutioni, admodum contrariae sunt, curationemque reddunt difficillimam, quod saepissime se expertum esse testatur Cl. KAEMPFF. Hujusmodi

Cautelae
circa sangui-
nis ventila-
tiones.

enim exinanitionibus debilitatur admodum tam solidorum, quam fluidorum motus, qui auctior factus egregie infarctuum resolutionem atque excretionem promovet. „ Illius „ enim indoles & praecipua virtus est, ut humores subsistentes eorumque stases & stagnationes concutere, latibulis extundere, resolvere, iterum in motum ciere, & sic obstructions vasorum referare possit. Hic quoque motus spissos, immobiles impactosque humores fluxiles ac progressu idoneos reddit, pariterque copia delinquentes succos ipsumque sanguinem per congrua loca exonerandos, nec non excrementitios, serosos, salios per diversi generis emunctoria proscribendos quam maxime idoneus est „ 1).

Cacochymia & varii plethorae effectus ex infarctibus propullulant; (§. X - XIII.) itaque non nisi horum eliminatione cum constantia tolli, interea vero remediis convenientibus, inedia & corporis exercitatione minui possunt m).

Admittendae vero sunt sanguinis ventilationes in *initio morbi* potius, quam ipso morbo, ubi nulla de veris infarctibus est suspicio, ubi aeger evidenter plethora laborat, & non nisi lentior spissioris sanguinis circuitus mali causa est. In *vomitu cruento*, ex fluidi sanguinis circa ventriculum congestionem orto, venaesectione magnam curationis partem absolvit. Ea etiam celebranda est, ubi graviore cuidam symptomati urgenti, e. g. *apoplexiae*, sanguinis missione promptum ferri possit auxilium.

Circa purgantia & laxantia.

XXXVII. Purgantia, quin laxantia saepe repetita, nocent; spasmos enim augent, ventriculum totumque intestinorum canalem debilitant, emungunt suis succis (qui partim intestinorum tunicas irrigare, partim resorberi & venae portarum sanguini tradi debent) vasorum concrementa neque solvunt,

1) F. HOFFMANN de optima naturae morbis medendi methodo, Oper. om. T. I. p. 406. §. 7.

m) Confer. F. HOFFMANNI Diss.

de medico sui ipsius, §. 17. Oper. om. T. V. p. 244. & ejusdem Diss. de Inedia magnorum morborum remedio, §. 4. Op. T. V. p. 330.

solvunt, neque eliminant, sed subtractis fluxilioribus humoribus ea potius firmant & augent. Varii aegri, hypochondriacis inprimis pathematibus laborantes, mihi hac de re sciscitanti affirmaverunt, se, post leniter etiam laxantis medicamenti assumptionem, semper majorem flatulentiam, & alvi, antea segnis, pertinaciorum constipationem expertos fuisse.

XXXVIII. Aquae minerales, ad quas, tanquam ad *sa-* *Circa aquas*
cram anchoram, confugiunt in multis morbis chronicis, & in *minerales.*
 specie in pathematibus hypochondriacis, licet interdum quorundam symptomatum inducias faciant, mali tamen nostri materiam, causam, sedem non attingunt, nec tollunt; imo cum praemissis, subinde etiam interpositis, venaesectionibus & laxantibus, magna plerumque quantitate ingurgitentur: majorem visceribus chylopoiëticis inferunt debilitatem, malumque adaugent; Hinc merito de illarum usu in malo hypochondriaco censet *Cel. IVNCKERVS*, quod remedium gravius sit ipso morbo n).

XXXVIII. In infarctibus vasorum ventriculi *Quid in spe-*
mica panis & speciebus nervinis repletos, liquore quodam
spirituoso irrigatos regioni epigastricae imponere convenit. *cie agen-*
Eidem scopo inserviunt unguenta ex unguento altheae, oleo *dum in in-*
chamomillae, verbasci, lauri, cum spiritu vini camphorato *farct. vas.*
vel alio liquore spirituoso subacta. Hisce etiam, sub ipso *ventriculi?*
vomitum cruento abs memoratis infarctibus orto, nimios suc-
cussus moderari, imminentemque ventriculo inflammationem
praecaveri asserit Cl. KAEMPFF.

XL. In ipso hujusmodi vomitus paroxysmo modo lau- *In vomitu*
datus auctor enemata ex olei lini unciis decem & tribus ovo- *cruento?*
rum vitellis, pediluvia artuumque inferiorum frictiones com-
 mendat, aquas diapnoicas, temperantes, diluentes cum tan-
tillo extracti cascarillae, liquoris anodyni min. H. & essentiae
mille-



millefolii exiguis dosibus propinare jubet ; cum pulveres ventriculus non ferat atque ipsum nitrum suspectum sit. Post paroxysmum grumos sanguinis in ventriculo remanentes eliminandos, fibrasque roborandas suadet extracto rhabarbari aquoso o).

In uteri infarctibus resolvendis?

XLI. In concrementis uteri resolvendis *juncta graviditas* caute incedere jubet medentem. Acquiescendum tum est in enematis quotidianis, partitis nonnunquam portionibus infundendis, in infusis theaeformibus aperientibus, temperatis, in unguentis, §. XXXVIII. descriptis, abdomini & regioni pubis illinendis, adjunctis pro re nata pilulis balsamicis. Omnium vero horum remediorum usum modo suspendere convenit, modo reassumere, prouti prudenti medico e re visum fuerit, qui solícite cavebit, ne incongrua remediorum administratione abortui vel alii malo occasio suppeditetur.

Post *partum* vero non solum uterum a sanguinis grumis purgare decet, sed etiam perita obstetricantis manus explorare debet, annon in ejus cavo talia haereant concrementa? & si adsint, ea ab utero separari & extrahi debent, illis prorsus adhibitis cautelis & encheiresibus, quibus adhaerentem utero placentam avellimus atque excutimus.

XLII. Tum temporis etiam conveniunt injectiones in ipsum uteri cavum factae, mediante siphone in hunc finem fabrefacto. Huic scopo convenit decoctum ex radice juniperi, floribus sambuci cum tantillo extracti myrrhae aquosi, croci & nitro.

Porro etiam, & in genere *extra graviditatis statum*, spongas simili decocto imbutas, regioni pubis & genitalibus imponere operae pretium est. Conducunt etiam vapores, ex herbis solventibus, uterinis, genitalibus immitendi, sacculi (XXXVIII.) scopo tam resolvendi concrementa, quam vasa roborandi.

Hae-

Haemorrhagiae si superveniant, eae non stypticis sistendae, sed remediis temperantibus moderandae sunt, atque per totum puerperii tempus id sedulo observandum est, ut lochiorum fluxus rite procedat, & uterus probe purgetur; quibus si ea simul, quae juxta tertiam & quartam indicationem §. XXXIV. commendavimus, jungantur, curatio non tantum absolvitur feliciter, sed & simul nova concrementorum genesis praecavetur. Et haec de speciali concrementorum curatione sufficiant.

XLIII. Restat nunc, ut generatim exponam, qualis diaeta & Regimen. ta, quale regimen aegris, infarctibus laborantibus, convenient? *Cibos* quod attinet, paulo solidiores eligendi sunt, ex *media materia*, ut CELSVS eos appellat, qui minus facile concoquantur, sed si concocti sunt, plus alunt; simplices vero sunt, sine multo apparatu, sine blandimentis, parati. Perniciosus error est, non nisi facillimae digestionis cibos, juscula carni-um, cremores hordei, &c. ejusmodi aegris exhibere, dum enim tener & mollis victus ventriculo ferias facit, idem ip-sius fibris muscularibus accidit, quod omnibus musculis eve-nit, si corpus otiosa quiete diffluat; jusculorum vero calido-rum continua ingestio notabilem ipsi infert laxitatem, unde di-gestio indies magis magisque vitiatur. Hinc etiam in ipsa primarum viarum debilitate curanda eo quoque respiciendum esse monet *Cel. LUDWIG*, „ne mera juscula, vel cibi per prae-„parationem jamjam ex parte digesti assumantur; Haec enim, „pergit *Cl. Auctor*, licet particulis nutrientibus copiosis sca-„teant, primas tamen vias valdopere relaxant. Ea itaque eli-„genda potius sunt ciborum genera, quae quandam consisten-„tiam habent, & post masticationem & salivae admixtionem „praegressam aliquam quoque ventriculi actionem exposcunt, „quo is ad contractiones crebriores & subsequens inde majus „fibrarum robur disponatur. „ p)

In

p) Disp. de primarum viarum debi-litate, Lips. 1748. pag. 26. Hoc momentum diaeteticum admo-

dum urget *Cl. KAEMPFER*, sequen-tibus verbis: „Optime experien-„tia didicimus, quod in illis quo-„que

In debilissimis aegris incipiendum est abs imbecillioris materiae victu, ita tamen progrediendum, ut pededentim ad validiores cibos deveniamus. Ea vero sit assumptorum quantitas, quae ventriculum minime oneret; coena semper sit parca.

Potui inservire potest, frigida, pura, levis, fontana & cursu exercitata, vel prisana, ex convenientibus speciebus concinnata, & ad aegri gustum accommodata. In prandio etiam modicus vini burgundiaci, Pontac, vel alius bonae notae haustus subinde ~~conferat~~; inprimis vero commendari merentur vina medicata, amara, stomachica, ad aliquot uncias ante pastum haurienda. Caffeeae potus, licet, si fabae bonae notae & maturae sint, languenti ventriculo alienus non sit, ob alias tamen rationes suspectus est, neque eum absque subsequenteribus incommodis facile ferunt aegri. Cerevisiae, nostrates saltem, liquores spirituosii, non conducunt.

Praeter rectum cibi potusque usum tanquam non leve curationis adminiculum considerandus est *motus*, corporis exercitatio moderata, sufficiens tamen & viribus aegri proportionata: deambulatio, equitatio, vectio in rheda, ludus tudicularis cum pilis eburneis, &c. Imbecillioribus, qui lectulo suo affiguntur, neque ullum exercitationis genus sustinere valent, conducunt frictiones abdominis artuumque.

Litterarum cultores studiis animi vires excitent, non frangant.

Somni etiam ratio habenda est, quem potissimum ante mediam noctem capere satius est. Denique *animi affectuum* cura non est posthabenda. Qui memoratis infarctibus laborant, phantasia varie depravata saepe aegrotant, moerore animique dejectione affliguntur, vel saltem a consueta laetitia detrahi se sentiunt

„que affectibus, ubi ventriculi intestinorumque tonus atque actio
„praeprimis languebant, nisi iis
„succurratur, atque remediis pharmaceuticis simul primario & diaeteticis solidior subjungatur, optima quoque pharmaca operationem

„suam exerere haud valeant, sed
„quod diaeta molliori, evchyla, aquosa, jusculisque gelatinosis aegrorum pathemata graviora reddantur, atque ipse tandem interitus acceleretur., de inf. vas. infimi ventris. p. 27.

sentiunt perpetuo; male hinc & corpus habere, notissimum est. Ergo animus erigendus, exhilarandus est, abs tristi imaginationis objecto avertendus, quibusvis mediis huic fini inservientibus.

XLIV. Et hic terminus esto dicendorum! neque enim hic Epilogus. locus vel animus est, gloriose commemorare, quantam lucem morborum, inprimis chronicorum, aetiologiae afferre queat proposita theoria, & quos usus practicos habitura sit commendata medendi methodus. Hoc tamen, absque ostentationis suspicione, affirmare ausim, quam plurimos eosque inexpugnabiles subinde reputatos morbos exposita methodo superari posse. Non possum non *practicotati* KAEMPFFII, viri cordati & abstrahonica, quae medicum non decet, magniloquentia remotissimi effato meum assertum obsignare: „Haec, ita ait ille, q) „medendi methodus ea est, qua infarctus felicissime resolutos, „atque non solum gravissimos affectus hypochondriacos, verum etiam alia adhuc eaque dirissima pathemata, quae non „pauci medicorum plane insanabilia declararunt, felicissime „sane profligata, atque miserrime aegrotantes, quantum pro „ceterarum circumstantiarum ratione fieri potuit, sanitati iterum restitutos, vel ubi infarctus jam plane erant inveterati „aut incarcerati atque corrupti, ad minimum tamen „summopere sublevatos fuisse vidimus.

q) l. c. pag. 26.





NOBILISSIMO DOCTISSIMOQUE
DOMINO AVTORI
HUIUS SPECIMINIS ACADEMICI

S. P. D.

PRAESES.

*Autorem praesentis laboris a fronte ipsius Te profiteris. Pa-
res undique habes idem nomen insonantes. Ecquos vero?
Impares sane & studiis & moribus, eosque idcirco hoc nomi-
ne saepe quam indignissimos. Par impar luditur in hac re,
ut parum inde honoris in Te proficisci videri posset, qui eo-
dem nomine Te orbi sistis literario. Sed res est in salvo. Duo
cum faciunt idem non est idem. Quâ igitur idem feceris con-
siliî, quâ modestiae, quâ meritorum ratione & praerogativâ
publice profiteri jubeor. Infra vires Tuas Tibi fidens, pro Tua,
quâ alios promptae audaciae homunculos evidenter antecellis, mo-
destia, Tibi hanc sumere scriptionem vix ausus es, nisi monitus
rogatusque. Edendo itaque ejusmodi specimini Te parem fore
judicavi, non imparem fuisse ex edito judicabunt mecum aequi-
rerum aestimatores. Simulent dissimulentque proinde harum
rerum se autores, alii. Emant vendantque hos suos utpluri-
mum abortivos foetus academicos. Sed erubescant ipsimet ipsos
intuentes. Olim non sic, nec hodie ita bene. Haud solum
alios sed & seipsos decipiunt utrinque, & simulantes, quae non
habent, merita, & simulata dissimulantes. Majoris etiam mo-
menti ac vulgo creditur, in republica sunt ejusmodi similesque*
de-



*deceptiones academicae. Peritos in arte sua postulat Respu-
blica bene constituta. Peritus vulgo habetur promotus. Sed
creditur a mille quamvis idiota sit ille.*

*Quid mirum, quod legum sacerdotes ipsis promotis non semper
fidem concedant. Verum turpissimae hujus notae defraudatores
feliciter saepe seipsos magis quam alios defraudant. Quae dis-
simulari volunt infelices saepe eorum inspiratores quæstum inde
turpem facientes ipsa eorum sufflata verba factaque dissimulare
nequeunt. Seipsos facile etiam produnt ipsi ducentium & se-
ducentium sequaces & artem suam clanculario modo condiscen-
tes affectae, qui certa mercede sua pacisci merita non dubitant,
pusilli hujus fortis heroes, vel quae ficto nomine sua faciunt
plane muta arrogantia possidentes vel garrula protervia multa
loquendo agendoque, nil agunt, nil dicunt dicacesque inanes, lar-
giloqui, magnidici, cothurni harioli & phreniticis deliriis quae-
cunque in mentem vagabundam linguamque volubilem veniunt
garrientes, effutientes, blatterantes, balbutientes tumultuoso stre-
pitu in sacra Medicinae irruunt, doliis vacuis, quam plena
maiores sonos edentibus, similes. Nonne rebus ita constitutis
REIESIO, quam in Camp. Elys. Q. 6. n. 4. 5. habet,
querelam repetere licet: o tempora, o mores! prodeunt
quotidie - - - subreptitii ac supposititii Doctores, ad
praemia & honores evecti & nescio quibus academiis
velut ex templo Doctoratus gradum consequuntur, per-
actis ceremoniis, non examinatis studiis, cathedram ascen-
dunt, & cuncta jam ex alto despicientes, confusum
quidpiam murmurant, tinniunt interim campanae, stre-
punt tubae - - - hymno dicto descendit sopiens qui
stultus ascenderat. Mira prorsus transformatio nec Ovi-
dio cognita: tumet ille statim, stupet vulgus, plaudunt
G
affines*



affines, qui nil aliud, quam asinum, quem adduxerunt, deportant, Cumano illo indoctiorem, qui chartas vix evolvere novit, quem tandem si in medicis consulas, reperies hunc tot DECIPERE dare, quot RECIPERE, mortemque verius accire posse, quam valetudinem.

Quantum distas ab illis, nobilissime Domine Licentiate! gratulor hanc Tibi praerogativam. Sed cur tam sero eam ambis publice? Sat cito, si sat bene. Suus virtuti constat bonor. Praefestinati aliorum consiliis praereptos Tibi honores meritis praeripere maluisti. Exteri Tuam mihi testatam fecerunt dignitatem, nostrates eam testatiorem reddunt, unanimi decreta ista Tibi est consensu ab ordine Facultatis nostrae medicae. Beatiss. Soceri mei & meo post fata ejus tristissima tempore, quo nostros intra parietes Te uti licuit, nunquam non & studiorum Tuorum & vitae Tuae ratione Te quoti modo comprobatum habuimus. Proximis denique demonstrationibus meis anatomicis non otiosus interfuisti, sed & singulari diligentiae & dexteritatis specimine socias manus in praeparandis cadaveribus admovendo docuisti, Te non solum theoreticae, sed & practicae Anatomiae strenuam navasse operam. Quid plura? veritatem dictorum ipsa manifestat providentia divina, quae labores Tuos felicissimo nutu coronat. Haec Tibi Tuisque, quos meo nomine quoque salvos esse jubeas in omnibus rebus porro adsit benignissime. Hisce precibus Tibi valedico Tuaeque me amicitiae in posterum quoque commendatum esse volo.

e mus. d. 16 Maji.

1754.

